



آمی تریپتیلین ۱۰ و ۲۵ میلی گرم

قرص روکش دار

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی گردد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- بزرگسالان:
- ضدافسردگی: ۲۵ میلی گرم ۲ یا ۴ بار در روز، دوز دارو برحسب نیاز و تحمل بیمار تنظیم خواهد گشت.
- کودکان:
- ضدافسردگی: ۱۰ الی ۳۰ میلی گرم به صورت خوراکی و یا ۱ الی ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در روز، در دو دوز منقسم.
- بالای ۱۲ سال: ۱۰ میلی گرم سه بار در روز و ۲۰ میلی گرم شب هنگام خواب.
- دوز دارو برحسب نیاز و تحمل بیمار تنظیم خواهد گشت. حداکثر میزان مصرف در روز ۱۰۰ میلی گرم می باشد در دو دوز منقسم یا در یک دوز واحد شب هنگام خواب.

تداخلات دارویی:

- الکل، داروهای سرکوب کننده سی سیستم اعصاب مرکزی، داروهای ضد تیروئید، فنوتیازین ها، سیمتیدین، کلونیدین، گوانیدین، داروهای ایجاد کننده واکنش های اکسترایپریدال، مهارکننده های مونوآمینوآکسیداز، سمپاتومیتیک ها

عوارض جانبی:

- همدارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید.
- عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:
- عوارض با شیوع کمتر: عوارض آتنی کولیت، ریک، ضریان قلب شلته، سریع یا آهسته، لرزش عضلات، کاهش فشار خون، بی قراری، سندرم پارکینسون، اختلال عملکرد جنسی
- عوارضی که در صورت تداوم یا آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:
- عوارض با شیوع بیشتر: خواب آلودگی، خشکی دهان، سردرد، افزایش اشتها، تهوع، افت فشار خون وضعیتی، ضعف، احساس طعم بد، افزایش وزن
- عوارض با شیوع کمتر: اسهال، افزایش تعریق، سوزش سردل، مشکلات خواب، استقراف عوارض زیر ممکن است در اثر قطع دارو رخ دهند و اگر بعد از قطع دارو پس از استفاده طولانی مدت مشاهده شدند نیاز به مراقبت پزشکی دارند:
- سردرد، تهوع، استقراف، اسهال، مشکلات خواب، هیپانانت غیر معمول، تحریک پذیری، ضعف

مسمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری گردد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

- قرص آمی تریپتیلین ۱۰ و ۲۵ میلی گرم به صورت ۱۰ پلیستر ۱ عددی در جبهه متوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می گردد.

راهنمای های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه ی آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- حساسیت به ضدافسردگی های سه حلقه ای، مایوتیلین یا ترازودون
- در صورت بارداری و شیردهی
- استفاده در کودکان و افراد مسن
- به دلیل کاهش ترشح بزاق می تواند سبب مشکلات دهان و دندان شود.
- استفاده از سایر داروها خصوصاً مهارکننده های سیستم اعصاب مرکزی
- عوامل ضد تیروئیدی، سایمتیدین، کلونیدین، گوانتیدین، فنوتیازین ها، داروهای ایجاد کننده واکنش های اکسترایپریدال، مهارکننده های مونوآمینوآکسیداز، متیریزامید یا سمپاتومیتیک ها
- وجود بیماری ها خصوصاً الکلیسم، آسم، اختلالات دوقطبی، اختلالات خونی و قلبی، مشکلات گوارشی، گلوکوم یا افزایش فشار داخل چشمی، اختلال عملکرد کبدی و کلیوی، پرکاری تیروئید، هایپرتروفی پرستات، اسکیزوفرنی، تشنج، بازگشت ادرار

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

- جهت کاهش عوارض گوارشی دارو را همراه با غذا میل نمایید.
- دوره درمان را کامل کنید. دارو را کمتر یا بیشتر از میزان تجویز شده مصرف ننمایید.
- جهت رسیدن به اثر ضدافسردگی دارو، ممکن است بین ۱ الی ۶ هفته زمان نیاز باشد.
- در صورت فراموشی کردن مصرف دارو، اگر برنامه مصرف دارو بیش از یک نوبت در روز است، دارو را به محض به یاد آوردن مصرف کنید مگر اینکه زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده باشد که دوز دارو را دو برابر نکنید.
- اگر برنامه مصرف دارو یک نوبت شب هنگام خواب می باشد، در صورت فراموشی آن، به دلیل عوارض جانبی آن را در صبح مصرف نکرده و با پزشک خود مشورت نمایید.
- از مصرف فرآورده های حاوی الکل خودداری نمایید. از استفاده سایر داروها بدون تجویز پزشک خودداری نمایید.
- این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی گردد. لذا هنگام مصرف از رانندگی و کار با وسیله ای که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
- این دارو ممکن است سبب سرگیجه گردد. لذا هنگام برخاستن و تغییر حالت از نشسته و خوابیده احتیاط نمایید.
- این دارو ممکن است سبب خشکی دهان گردد که می تواند از آرتینات یا آدامس بدون شکر، یخ یا جایگزین بزاق استفاده نماید. اگر خشکی دهان بیش از دو هفته ادامه داشت با پزشک یا دندان پزشک مشورت نمایید.
- این دارو ممکن است سبب حساسیت پوست به نور گردد. لذا از لوازم محافظت از پوست در برابر آفتاب استفاده نمایید.
- در صورت انجام هرگونه جراحی، مشکلات دندان و شرایط اورژانسی احتیاط نمایید.
- قبل از قطع دارو با پزشک مشورت نمایید.
- موارد احتیاط را به مدت ۳ الی ۷ روز بعد از قطع دارو رعایت نمایید.

موارد منع مصرف:

- در موارد زیر نسبت اثرات مفید دارو به عوارض آن باید در نظر گرفته شود:
- حساسیت به ضدافسردگی های سه حلقه ای، کاربامازپین، مایوتیلین یا ترازودون
- وجود بیماری ها خصوصاً الکلیسم، آسم، اختلالات دوقطبی، اختلالات خونی و قلبی، مشکلات گوارشی، گلوکوم یا افزایش فشار داخل چشمی، اختلال عملکرد کبدی و کلیوی، پرکاری تیروئید، هایپرتروفی پرستات، اسکیزوفرنی، تشنج، بازگشت ادرار



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران