



باکلوفن ۲۵ و ۱۰

قرص خط دار

عوارض جانبی:

هر دارو به موارد اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

عوارض با شیوع کمتر یا نادر: ادرار خونی یا تیره، درد قفسه سینه، مسمومیت سیستم اعصاب مرکزی (شامل توهم بینایی و شنوایی، افسردگی یا دیگر تغییرات رفتاری، صحتی زنگ یا وزوز در گوش)، التهاب پوست، حساسیت، کیستهای تخمدان و سنکوپ.

عوارضی که در صورت تداوم یا آزاد رنده بدن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

عوارض با شیوع بیشتر: اثرات سیستم اعصاب مرکزی مانند خواب آلودگی، گیجی، ضعف، ضعف عضلانی و تهوع. عوارض با شیوع کمتر یا نادر: اثرات سیستم اعصاب مرکزی مانند مشکل در کنترل ماهیچه ها، عدم احساس خوب، سردرد، درد عضلانی، احساس سوزش یا مورمور شدن در دستها و پاها، مشکلات تکلم، مشکلات خواب، هپان غیر معمول و خستگی غیرمعمول، یبوست، ادرار سخت یا دردناک یا کاهش مقدار ادرار، احتباس مایعات بدن، احبار به دفع ادرار مکرر یا دفع ادرار بدون اختیار، تحریک سیستم گوارشی، از دست دادن اشتها، کاهش فشار خون، پش قلب و مشکلات جنسی در آقایان.

عوارضی که در صورت بروز به دلیل قطع ناگهانی مصرف نیاز به مراقبت پزشکی یا از سرگیری درمان دارند:

تشنج، توهم بینایی و شنوایی، افزایش گرفتگی های ماهیچه ای، تغییرات رفتاری یا روانی مانند تفکرات هذیان یا جنون، عصبانیت و بی قراری غیر معمول. نکته: عوارض عصبی این دارو در سالمندان بیشتر دیده می شود.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری گردد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

قرص های باکلوفن ۲۵ و ۱۰ میلی گرم، به صورت ۱۰ پلیستر ۱۰ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می گردد.

L-T248-00

Reference:

1) USPDI 2007, 27th Edition, Vol 1, Drug information for health care professional, pages:492

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بهیاری فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه ی آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- حساسیت به باکلوفن
- استفاده از داروهای ضد افسردگی و داروهای تضعیف سیستم اعصاب مرکزی
- سابقه دیابت، صرع، سکته مغزی، اختلالات روانی و اختلالات کلیوی

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

- در صورت فراموش کردن یک دوز دارو، به محض به یاد آوردن آن را مصرف نمایید. ولی اگر فاصله کمی به مصرف دوز بعد باقی مانده بود آن را استفاده نکرده و از دو برابر کردن دوز مصرفی خودداری نمایید.
- اگر با مصرف دارو دچار خواب آلودگی، گیجی و اختلالات بینایی می شوید در هنگام کار و رانندگی احتیاط کنید.
- مصرف دارو را به یکباره و بدون مشورت با پزشک خود قطع نکنید.
- از مصرف الکل و داروهای تضعیف سیستم اعصاب مرکزی خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

- در موارد زیر نسبت اثرات مفید دارو به عوارض آن باید در نظر گرفته شود:
- نارسایی عملکرد کلیوی

مصرف در بارداری و شیردهی:

- اطلاعات کافی و کنترل شده ای در مورد مصرف این دارو به هنگام بارداری در انسان صورت نگرفته است، لذا مصرف آن باید با احتیاط صورت گیرد.
- این دارو در شیر توزیع می گردد، اما مشکلی در انسان گزارش نشده است.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- بزرگسالان بعنوان ضد اسپاسم و ضد درد (نورالژی عصبی سه قلو) : در شروع ۵ میلی گرم سه بار در روز؛ در صورت نیاز، افزایش به میزان ۵ میلی گرم در روز، هر سه روز یکبار تا بروز پاسخ مطلوب، حداکثر تا ۸۰ میلی گرم در روز. در صورت مصرف به صورت ۴ بار در روز پاسخ مطلوب تر ایجاد خواهد شد.
- کودکان
- ایمنی و اثر بخشی در کودکان به اثبات نرسیده است.

تداخلات دارویی:

داروهای ضد افسردگی های سه حلقه ای، داروهای ضد دیابت خوراکی، انسولین، داروهای ضد فشارخون، لوودوپا گریبی دوپا، داروهای تضعیف سیستم اعصاب مرکزی، مهارکننده های مونوآمینوآکسیداز و داروهای مسدودکننده عصبی-عضلانی



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

Valliasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsuos Road, Tehran 1398834111 - IRAN www.ramopharmin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر 4 جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا،
خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۱۳۴۱۱۱
تلفن: ۰۲۴ - ۰۲۱ - ۴۴ ۵۰ ۳۵ ۵۰ - ۴۴ ۵۰ ۳۵ ۵۰ - ۴۴ ۵۰ ۳۵ ۵۰