



فلوکستین ۲۰ میلی گرم کپسول

راهنامه‌ای‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا تیموییه‌ای آن به دیگران خودداری ننمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

- حساسیت به فلوکستین
- در صورت بارداری و شیردهی
- استفاده در کودکان
- مصرف همزمان با داروهای مهارکننده مونوآمینوآکسیداز و تیوریدازین ممنوع می‌باشد.
- در صورت مصرف داروهای خصوصاً آلپرازولام، آسپرین، آستمیزول، ضد انعقادها، دی‌تیلایس، دیزیتوکسین، موکلونامید، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، فنی‌توئین، داروهای با فعالیت سروتونرژیک، ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای
- به‌چند بیماری‌ها خصوصاً اختلالات دو قطبی، اختلال عملکرد کبدی
- به‌پزشک خود درمورد تمامی داروهای مصرفی خود (نسخه‌ای و غیر نسخه‌ای) اطلاع دهید.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه فرمایید:

- دارو را کمتر یا بیشتر از میزان تجویز شده مصرف ننمایید.
- جهت مشاهده اثر ضدافسردگی دارو ممکن است درمان طی ۴ هفته یا بیشتر، برای اثر ضد وسواس فکری ۵ هفته یا بیشتر و اثر ضد پرخوری عصبی طی ۱ هفته و یا ۴ هفته و بیشتر صورت گیرد.
- در صورت فراموشی یک نوبت از دارو، آن را نادیده گرفته و به برنامه منظم خود بازگردید. میزان مصرف را دو برابر نکنید.
- هنگام قطع مصرف دارو کاهش میزان مصرف باید تدریجی و تحت نظر پزشک صورت گیرد.
- در صورت مشاهده علایمی مانند رفتارهای غیر عادی، بدتر شدن افسردگی و یا افکار خودکشی سریعاً به پزشک اطلاع دهید.
- در صورت مشاهده راش و یا هرگونه علایم واکنش حساسیتی فوراً به پزشک اطلاع دهید.
- داروی فلوکستین به فاصله ۲ هفته از قطع مصرف داروهای مهارکننده مونوآمینوآکسیداز و این داروها به فاصله حداقل ۵ هفته بعد از قطع داروی فلوکستین مصرف نگردند.
- به دلیل احتمال بروز خواب آلودگی، اختلالات فکری و حرکتی، هنگام رانندگی و انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، احتیاط نمایید.
- از مصرف فرآورده‌های حاوی الکل خودداری ننمایید.
- در صورت بروز عوارض گوارشی دارو را بعد از غذا میل ننمایید.

موارد منع مصرف:

مصرف دارو در موارد زیر به جز در شرایط ویژه ممنوع است:

- حساسیت به فلوکستین
- در موارد زیر نسبت اثرات مفید دارو به عوارض آن باید در نظر گرفته شود:
- اختلالات دو قطبی
- اختلال عملکرد کبدی

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی فقط تحت نظر پزشک متخصص صورت گیرد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- بزرگسالان:
- ضد افسردگی و یا ضد وسواس فکری
- در ابتدا ۲۰ میلی‌گرم روزانه صبح‌ها، در صورت نیاز و تحمل بیمار دوز دارو در فواصل ۴ تا ۸ هفته‌ای می‌تواند افزایش یابد.
- ضد پرخوری عصبی
- دوز هدف روزانه ۶۰ میلی‌گرم می‌باشد. بیمارانی که نیاز به افزایش تدریجی دوز دارو در چندین روز برای این مقدار مصرف را داشته باشند.
- کودکان:
- ایمنی و اثربخشی دارو در کودکان به اثبات نرسیده است.

تداخلات دارویی:

آلپرازولام، ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای، آسپرین، داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی و یا دیگر داروهای مداخله‌کننده در هموستازیس، آستمیزول، داروهای که به پروتئین‌های زیادی متصل می‌شوند خصوصاً ضد انعقادها، موکلونامید، مهارکننده‌های مونوآمینوآکسیداز، فنی‌توئین، داروهای با فعالیت سروتونرژیک، تیوریدازین.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

عوارض با شیوع بالا: بی‌قراری، اختلال عملکرد جنسی، راش پوستی، کفایت یا خارش عوارض با شیوع کمتر: تب و لرز، درد عضلات و مفاصل

عوارضی که در صورت تداوم یا آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

عوارض با شیوع بالا: عصبانیت، بی‌اشتهایی، ضعف و خستگی، اسهال، خواب آلودگی، سردرد، افزایش تعریق، بی‌خوابی، تهوع، لرزش

عوارضی که در صورت بروز بعد از قطع دارو نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

تیرگی پذیری، عصبانیت، گیجی، سرگیجه، خلق و خوی ناخوشایند، احساسات ناپایدار، خستگی، سردرد، میوکلانیا، بی‌خوابی، خواب آلودگی، بی‌حالی، تهوع، مورمور شدن، تعریق، خونریزی واژینال.

مسمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری گردد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته‌بندی:

- کپسول فلوکستین ۲۰ میلی‌گرم به صورت ۱۰ پلیستر ۱۰ عددی درجعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته‌بندی می‌گردد.

Reference:

1) USPDI 2007, 27th edition, Vol II, Drug information for health care professional, pages: 1436-1442



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Mahknuos
Road, Tehran 13 98 83 41 11 - IRAN www.ramofarmin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی می‌نا،
خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۱۱۸۸۳۴۱
تلفن: ۲۴ - ۲۰ ۵۳ ۶۳ ۴۴ ۲۱ - نمابر: ۳۵ ۵۰ ۴۴ ۲۱