



شربت هیدروکسی زین

۱۰ میلی گرم در ۵ میلی لیتر

■ مصرف این دارودر شیردهی توصیه نمی گردد.

مقدار و نحوه مصرف دارو :

بزرگسالان:

آرام بخش: ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم بصورت تک دوز.

ضد حساسیت و ضد تبوع:

۲۵ تا ۱۰۰ میلی گرم ۳ یا ۴ بار در روز.

کودکان:

آرام بخش: ۰/۶ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بصورت تک دوز.

ضد حساسیت و ضد تبوع:

برای کودکان کمتر از ۶ سال: ۳۰ تا ۵۰ میلی گرم روزانه در دوزهای

متنقسم.

کودکان ۶ تا ۱۲ سال: ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم روزانه در دوزهای متنقسم.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف همزمان داروهای زیر با پزشک خودمشورت نمایید:

مهارکننده های MAO، داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی،

الکل، داروهای آنتی کولینرژیک.

عوارض جانبی:

■ به دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز بعضی

عوارض ناخواسته در بعضی افراد نیز شود. اگرچه همه این عوارض

در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا

داروساز خود مشورت نمایید:

عوارض با شیوع کمتر یا نادر: آتافیلاکسی، کلستان، اعمال غیر عادی

کبدی و آریتمی قلبی.

در صورت پایداری عوارض زیر با پزشک خود تماس بگیرید:

عوارض با شیوع بیشتر: خواب آلودگی، خشکی دهان، یبونی و گلو،

مشکلات گوارشی، درد معده یا تبوع، افزایش اشتها یا افزایش وزن

وفاژتیت

مسمومیت:

■ در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را به مراکز

درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

■ دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور نگهداری و

از یخ زدگی محافظت گردد.

■ دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

■ شربت هیدروکسی زین حاوی ۱۰ میلی گرم هیدروکسی زین هیدروکلراید

هر ۵ میلی لیتر، در شیشه دارویی قهوه ای رنگ ۱۲۰ میلی لیتری، به

همراه برگه راهنما بسته بندی می گردد.

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن

در موارد مشابه و یا توصیه ی آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

■ در صورت مصرف سایر داروها مخصوصا تشعیه کننده های CNS، الکل

آنتی کولینرژیک ها و مهار کننده های MAO.

■ بارداری و شیردهی

■ وجود هر نوع حساسیت به داروهای آنتی هیستامین، مواد محافظ،

رنگها و غذا.

■ در بیماران مبتلا به گلوکوم یا زاویه بسته، هیپرتروفی پرستات و

نارسایی کلیوی و کبدی، انسداد گردن مثانه یا احتیاط کامل مصرف

شود.

■ در کودکان و افراد مسن ممکن است باعث افزایش عوارض آنتی

کولینرژیک (در نوزادان یا نوزادان نارس) و افزایش تحریک پذیری

شود.

■ به دلیل کاهش یا مهار بزاق دهان ممکن است باعث افزایش مشکلات

دندان شود.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

■ در صورت فراموشی یک دوز به معض یادآوری آن را مصرف نمایید. اگر

تقریبا زمان مصرف دوز بعدی رسیده است از مصرف آن صرف نظر کرده

و دوزها را در برابر نکنید.

■ از مصرف الکل و سایر تضعیف کننده های سیستم عصبی خودداری کنید.

■ مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی شود. لذا در طول درمان

با آن از رانندگی و یا کار با ماشین آتانی که نیاز به هوشیاری کامل دارند

خودداری کنید.

■ از مصرف همزمان با مسکن ها و آرام بخش ها خودداری نمایید.

■ دارو را بیشتر از مقداری که پزشک تعیین کرده است، مصرف نکنید.

■ به دلیل احتمال اختلال این دارو در تست های پوستی، در صورت مصرف

این دارو پزشک خود را مطلع کنید.

■ این دارو ممکن است عوارض آنتوتوکسیک، به دلیل مسمومیت و مصرف

بالای سالیسیلات ها را بیوشاند.

موارد منع مصرف:

این دارو در موارد زیر نباید مصرف شود مگر به تجویز پزشک:

■ نارسایی کبدی و کلیوی.

■ در موارد زیر با احتیاط مصرف شود و مزایای آن نسبت به معایب در نظر

گرفته شود:

■ انسداد گردن مثانه، هیپرتروفی پرستات، احتباس ادرار، گلوکوم

(با زاویه باز و بسته) و حساسیت به آنتی هیستامین ها.

مصرف در بارداری و شیردهی:

■ مطالعات کافی و کنترل شده ای در مورد مصرف این دارو در دوران

بارداری در انسان صورت نگرفته است. اگرچه مصرف آن در ماههای

ابتدایی بارداری توصیه نمی شود.



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

Vallar Ave, Shlshe sazi Mlna St, km 4 Karaj Makhsoos
Road, Tehran 1398834111-IRAN www.ramopharm.in.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر 4 جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی میا،
خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۰۲۱ - ۴۴ ۵۳۶۰۲۰ - ۲۴ - ۴۴ ۵۰۳۵۰۵ - ۲۴