



گرام[®]

کتوتیفن

قرص ۱ میلی‌گرم / شربت ۱ میلی‌گرم در ۵ میلی‌لیتر

به یاد آوردن، آن نوبت را مصرف نمایید ولی چنانچه زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده باشد از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هردارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

■ در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک خود مشورت نمایید:

عوارض با شیوع کمتر: علائم شبه آنفولانزا و عفونت دستگاه تنفسی.

در صورت ادامه یا مزاحمت عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

عوارض شایع: افزایش وزن.

عوارض با شیوع کمتر یا نادر: درد شکمی، تحریک سیستم اعصاب مرکزی (هیجان، تحریک پذیری، بیخوابی و عصبی شدن)، گیجی، خشکی دهان، خونریزی غیرعادی از بینی، افزایش اشتها، خواب آلودگی، راش پوستی، تورم پلک‌ها و اختلال خواب.

توجه: در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده و بروز علائمی از قبیل گیجی، عدم هوشیاری، تشنج، کاهش فشارخون و افزایش ضربان قلب، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

قرص: دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری گردد.

شربت: دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی:

قرص گرام ۱ میلی‌گرم، در جعبه های ۱۰۰ عددی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

شربت گرام (۱ میلی‌گرم در هر ۵ میلی‌لیتر)، در شیشه قهوه‌ای رنگ ۱۲۰ میلی‌لیتری با درب پیلرپیروف به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌شود.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی‌های عمومی جهت مصرف دارو:

■ مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی گردد، لذا ضمن درمان به ویژه در مراحل اولیه از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

■ به منظور کنترل پیشرفت درمان به طور منظم با پزشک خود در تماس باشید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

■ وجود هرگونه حساسیت به کتوتیفن و یا به هر یک از مواد تشکیل دهنده دارو.

■ در صورت مصرف سایر داروها به ویژه داروهای ضد دیابت خوراکی، آنتی هیستامین‌ها، خواب آورها، آرامبخش‌ها و الکل.

در صورت داشتن بیماری به ویژه بیماری‌هایی از قبیل دیابت ملیتوس و صرع.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در انسان برای مصرف در دوران بارداری انجام نشده است.

این دارو در شیر حیوانات ترشح می‌شود و ممکن است در شیر انسان نیز ترشح شود بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی برای مادران شیرده توصیه نمی‌شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، مقدار مصرف این دارو به طور معمول به قرار زیر است:

بزرگسالان: ۱ میلی‌گرم دو بار در روز صبح و عصر (معادل ۱ قرص و یا یک پیمانه ۵ میلی‌لیتری شربت)

کودکان بالای سه سال: ۱ میلی‌گرم دو بار در روز صبح و عصر (معادل یک پیمانه ۵ میلی‌لیتری شربت)

کودکان ۶ ماه تا سه سال: ۰.۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دو بار در روز صبح و عصر.

■ دارو را می‌توان همراه غذا و یا بدون آن مصرف کرد.

■ در صورت فراموش کردن مصرف یک دوز، به محض

L-T138-02

Reference:

USP DI, 1997, VOL II, Page: 1768



ساخت شرکت داروسازی راموفارمین
تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsuos
Road, Tehran 13 98 83 41 11 - IRAN www.ramopharm.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی میتا،
خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۲۰ - ۴۴ ۵۳ ۶۰ - ۲۱ - ۴۴ ۵۳ ۶۰ - ۲۱ - ۴۴ ۵۳ ۶۰ - ۲۱ - ۴۴ ۵۳ ۶۰