



امپرازول ۲۰ کپسول

■ دارو را بیش از حد تجویز شده مصرف نکنید. در صورتی که یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یادآوردن آن را مصرف کنید. ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف کنید و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

■ دارو را قبل از غذا، ترجیحاً قبل از صبحانه میل کنید.

■ کپسول را به طور کامل بلعیده و از خرد کردن، جویدن و یا باز کردن آن خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض را یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:

■ بثورات پوستی، درد عضلانی، ادرار کدر یا خون‌آلود و سوزش و درد در هنگام دفع ادرار، تکرر ادرار، زخم مداوم در دهان، ضعف یا خستگی غیرعادی.

■ گلودرد و زخم شدن دهان و یا لب، خونریزی یا کبودی غیرعادی.

■ سایر عوارض جانبی معمولاً با ادامه مصرف دارو از بین می‌روند، در صورت تداوم و یا تشدید هریک از علائم زیر به پزشک مراجعه کنید:

عوارض شایع: دردهای شکمی و یا کولیک.

عوارض با شیوع کمتر: درد عضلانی، درد سینه، خواب‌آلودگی، اختلالات عصبی، درد قفسه سینه، سردرد، عوارض گوارشی (سوزش، تهوع، استفراغ، یبوست، اسهال یا مدفوع آبکی)، بثورات یا خارش پوستی، اختلالات تنفسی.

مسمومیت:

■ در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را به بیمارستان منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

■ در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

■ دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

■ بعد از هر بار مصرف در شیشه را محکم ببندید.

■ از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

بسته بندی:

■ کپسول امپرازول ۲۰ میلی‌گرمی به صورت ۱۴ عددی و ۲۸ عددی داخل شیشه‌های حاوی ماده جاذب رطوبت، در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

L-C111-01



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsoos
Road, Tehran 13 98 83 41 11 - IRAN www.ramopharmin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

■ دوره درمان را کامل کنید.

■ در صورت عدم بهبودی یا بهتر نشدن با پزشک خود تماس بگیرید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

■ وجود هر نوع حساسیت به امپرازول، غذاها، مواد محافظ و رنگها.

■ در صورت ابتلا به سایر بیماری‌ها از جمله بیماری‌های کبدی.

■ در صورت بارداری و شیردهی.

■ در صورت مصرف هر نوع داروی دیگر همراه با امپرازول خصوصاً

داروهای ضدانعقاد، دیابت‌پام، فنی‌تونین، ایتراکونازول و گتوکونازول.

■ از آنجایی که بهبود درد معده چند روز بعد از مصرف دارو آغاز

می‌شود در صورت تشخیص پزشک معالج جهت کاهش درد می‌توان

از آنتی اسید همزمان با مصرف این دارو استفاده نمود.

مصرف در بارداری و شیردهی:

■ در صورت بارداری و شیردهی در مورد مصرف این دارو حتماً با پزشک متخصص مشورت کنید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

بزرگسالان:

درمان برگشت اسید معده به مری: ۲۰ میلی‌گرم یکبار در روز به مدت ۴ تا ۸ هفته. در درمان التهاب مری ناشی از رفلاکس مری که به سایر درمان‌ها مقاوم است، ۴۰ میلی‌گرم یک بار در روز تجویز گردد.

درمان افزایش بیش از حد اسید معده: ۶۰ میلی‌گرم یک بار در روز که این مقدار طبق دستور پزشک می‌تواند تغییر نماید و درمان تا مدت زمانی که لازم است ادامه می‌یابد و مقدار مصرف تا ۱۲۰ میلی‌گرم سه بار در روز تجویز می‌گردد.

■ اگر مقدار مصرف روزانه بیشتر از ۸۰ میلی‌گرم باشد دارو باید در مقادیر منقسم طبق دستور پزشک مصرف شود.

درمان زخم دوازدهه:

۲۰ میلی‌گرم یک بار در روز در صورت لزوم تا ۴۰ میلی‌گرم یک بار در روز توسط پزشک تجویز می‌شود.

درمان زخم معده:

۴۰ میلی‌گرم یک بار در روز به مدت ۴ تا ۸ هفته

درمان زخم‌های گوارشی همراه با هلیکوباکتر پیلوری:

۴۰ میلی‌گرم یکبار در روز به همراه کلاریترومایسین ۵۰۰ میلی‌گرم سه بار در روز به مدت ۱۴ روز و سپس از روز ۱۵ تا ۲۸ امپرازول به مقدار ۲۰ میلی‌گرم یک بار در روز قبل از صبحانه تجویز می‌شود.

کودکان:

■ کارایی و ایمنی دارو در کودکان به اثبات نرسیده است.

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا،
خیابان ولیعصر، رویروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱
تلفن: ۲۴ - ۲۰ ۴۴ ۵۳ ۶۰ ۲۱ - ۲۴ ۵۳ ۶۰ ۲۱ - ۲۴ ۵۳ ۶۰ ۲۱ - ۲۴