



مفنامیک اسید ۲۵۰ میلی گرم کیپسول

در پی داشته باشد.

هیپروترنومینید.

مصرف در حاملگی و شیردهی:

مصرف این دارو در بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود مگر به تشخیص پزشک.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

بزرگسالان:

ضد درد یا ضد دردهای خفگی: ۵۰۰ میلی‌گرم در ابتدا سپس ۲۵۰ میلی‌گرم هر ۶ ساعت در صورت نیاز.
کودکان تا ۱۲ سال:
ایمنی و اثربخشی دارو در کودکان به اثبات نرسیده است.
دارو را با یک لیوان پر از آب مصرف نمایید و به مدت ۱۵ الی ۳۰ دقیقه دراز نکشید.
جهت کاهش عوارض گوارشی دارو را همراه غذا یا آنتی اسیدها (آنتی اسیدهای شامل آلومینیوم و منیزیم ارجحیت دارند) مصرف نمایید.

تداخلات دارویی:

مهارکننده‌های ACE (مانند کاپتوپریل، لیزیناپریل، لیزینوپریل و ...)، استامینوفن، الکل، مکمل‌های حاوی پتاسیم، کورتیکواستروئیدها، گلوکوکورتیکوئیدهای خوراکی، داروهای ضد انعقاد مانند هپارین، دیگوسین، داروهای ترومبولیتیک مانند استرپتوکیناز، وارفارین، داروهای ضد دیابت، انسولین، داروهای ضد فشارخون، داروهای مدر مانند تریامترن، اسپرین، والپروئیک اسید، گولشی سین، سیکلوسپورین، لیتیم، متوترکسات، پروپنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.
عوارضی که در صورت بروز منجر به قطع مصرف دارو شده و نیاز به درمان اورژانسی دارند: شوک آنفیلاکسی، آنژئودام، برونگواسپاسم.
عوارضی که نیاز به قطع مصرف دارو و مراجعه به پزشک دارند: بند نیامدن خون، خون دماغ شدن، بدلیل، درد قفسه سینه، تشنج، از هوش رفتن، زخم و خونریزی گوارشی، دیسکرازی خونی، اسهال.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را سریعاً به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

دارو در دمای اتاق، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.
دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.
دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

کیپسول مفنامیک اسید ۲۵۰ میلی‌گرم به صورت ۱۰ پلیستر ۱۰ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

L-C115-01

Reference:

1)USPDI 2007, 27th Edition , Vol 1 , Drug information for health care professional , page : 379-401

راهنمای‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:
این دارو برای بیماری شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و توصیه‌های آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

حساسیت به آسپرین یا هریک از داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی و هریک از اجزای این دارو.
بارداری و شیردهی.
استفاده از افراد مسن.
استفاده از سایر داروها خصوصاً الکل، ضد انعقادها، اسپرین، سفالوسپورین‌ها، کورتیکواستروئیدهای خوراکی، سیکلوسپورین، لیتیم، متوترکسات، مکمل‌های پتاسیم، پروپنید، تریامترن و والپروئیک اسید.
ابتلا به بیماری‌ها خصوصاً دیسکرازی خونی، سایرین مغز استخوان، بیماری‌های قلبی یا قلبی - ریوی، مشکلات انعقادی، بیماری‌های کبدی، خونریزی‌های گوارشی، زخم و التهابات گوارشی، بیماری‌های کلیوی، استوماتیت (Stomatitis).

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

دارو را بیش از مقدار توصیه شده مصرف نکنید.
چنانچه دارو را ۱-۲ نوبت در روز مصرف می‌کنید در صورت فراموشی یک نوبت از دارو، اگر ۲-۳ ساعت بعد به یاد آورید فوراً دارو را مصرف نمایید در غیراین صورت از مصرف آن صرف نظر نمایید.
چنانچه دارو را بیش از ۲ نوبت در روز مصرف می‌کنید در صورت فراموشی یک نوبت از دارو، به محض یادآوری آن را مصرف نمایید مگر اینکه زمان مصرف دوز بعدی رسیده باشد، در این صورت مقدار مصرف دارو را ۲ برابر نکنید.
دارو را بیش از ۷ روز مصرف نکنید، مگر به دستور پزشک.
در استفاده طولانی مدت از این دارو به طور مرتب با پزشک خود ملاقات نمایید.
استفاده از الکل خطر ایجاد زخم را افزایش می‌دهد.
در صورت مشاهده این علائم سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید: ادم، خونریزی از زخم گوارشی، مشکلات قلبی، افزایش غیرطبیعی وزن و راش پوستی.
احتمال حساسیت به نور وجود دارد.
در صورت مشاهده علائم شبه آنفولانزا سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید، زیرا این علائم می‌تواند بیانگر یک واکنش جدی به دارو باشد.
در صورت اسهال شدید و راش پوستی دارو را قطع کرده و به پزشک خود اطلاع دهید.

موارد منع مصرف:

استفاده از این دارو در موارد زیر به جز در شرایط ویژه ممنوع است:
واکنش حساسیت شدید ایجاد شده توسط آسپرین یا سایرین داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی.
پلیپ بینی همراه برونگواسپاسم که توسط آسپرین ایجاد شده است.
در موارد زیر نسبت اثرات مفید به عوارض دارو باید در نظر گرفته شود:
خونریزی‌های گوارشی.
التهاب و زخم گوارشی مانند بیماری کرون
هوفیلی یا سایر بیماری‌های مربوطه شامل مشکلات انعقادی و مشکلات عملکرد پلاکت، اختلال عملکرد کلیوی
استوماتیت (Stomatitis)
استفاده از افراد مسنی که احتمال ایجاد عوارض کبدی یا کلیوی در آنها بیشتر است. همچنین افرادی که زخم‌ها و خونریزی‌های گوارشی در آنها می‌تواند پیامدهای جدی



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsoos Road, Tehran 13 98 83 41 11 - IRAN www.ramopharmin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی میتا،
خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۲۰ - ۵۳ ۶۰ ۴۴ ۲۱ - ۵۰ ۳۵ ۴۴ ۲۱ - ۵۰