



تداخلات دارویی:

عوارض جانبی:

عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

عوارض یا شیوع بیشتر: اسهال، سردرد.

مسمومیت:

شرایط نگهداری:

پستنه پندی:

کودکان:

USPDI 2007, VOL III, 27th Edition, Drug information for health care professional, pages: 2266-2270

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- وجود هر نوع حساسیت به پنتوپرازول یا هر یک از اجزای فرمولاسیون.
- در صورت بارداری و شیردهی.
- در صورت مصرف داروهای دیگر همراه پنتوپرازول خصوصاً وارفارین.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

- به منظور پیشرفت درمان به طور منظم به پزشک مراجعه نمایید.
- دوره درمان را کامل نمایید.
- در صورت فراموشی یک دوز به محض به یاد آوردن آن را مصرف نمایید.
- اگر زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده بود فقط آن را مصرف کرده و دوزها را در آن زمان ننخند.

موارد منع مصرف:

■ حساسیت به بنتورازول با هر یک از اجزای فرمولاسیون مصرف این دارو در موارد زیر به جز در شرایط ویژه ممنوع است:

مصرف در بارداری و شیردهی:

■ در مورد مصرف این دارو در دوران بارداری یا شیردهی باید با پزشک مشورت کرد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

■ مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین میکند، مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

بزرگسالان:

■ درمان برگشت اسید معده به مری: ۴۰ میلی‌گرم در روز به صورت خوراکی به مدت ۸ هفته، در صورت عدم بهبودی یک دوره ۸ هفته‌ای را می‌توان تکرار کرد.

پیشگیری از برگشت اسید معده به مری: ۲۰ میلی گرم در روز، صبح ها به صورت خوراکی، در موارد راجعه دوز می تواند به ۴۰ میلی گرم در روز افزایش یابد.

■ درمان زخم دوازده ناشی از هلیکوباکتری پیلوری: ۴۰ میلی‌گرم پنتوپرازول همراه با ۵۰۰ میلی‌گرم کلاریترومایسین و ۱۰۰۰ میلی‌گرم آموکسیسیلین

■ درمان زخم دوازدهه: ۴۰ میلی‌گرم در روز به صورت خوراکی به مدت ۲

■ درمان زخم معده: ۴۰ میلی‌گرم در روز به صورت خوراکی به مدت ۴ هفته و در صورت عدم بهبودی، یک دوره ۲ هفته‌ای را می‌توان تکرار کرد.

و در صورت عدم بهبودی، یک دوره ۴ هفته‌ای را می‌توان تکرار کرد.

■ ایمنی و اثربخشی دارو در کودکان ثابت نشده است.

■ دارو را همراه با قبل از غذا یا یک لیوان آب میل نمایید.

■ کپسول را به طور کامل بلعیده و از خورد کردن، جویدن و یا بازکردن آن خودداری نمایید.



Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Mahsuos
Road, Tehran 13 98 83 41 11 - IRAN www.ramopharmin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی میثا،
خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۲۰ - ۶۳۵۳۴۴ - ۵۲۱ - ۳۵۵۰ - ۴۴۵۰ - ۵۲۱