



گاباپنتین ۱۰۰ کپسول

راهنمای های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری ننمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

- حساسیت به گاباپنتین.
- در صورت مصرف سایر داروها به ویژه آنتی اسیدها و مورفین.
- سابقه بیماری خصوصاً اختلال در عملکرد کلیه.
- بارداری و شیردهی.
- استفاده در کودکان و افراد مسن.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه فرمایید:

- مصرف این دارو ممکن است باعث تاری دید، سرگیجه، خواب آلودگی و اختلال عملکرد مغزی و حرکتی شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری ننمایید.
- مصرف همزمان این دارو با الکل و یا داروهای مهارکننده CNS باعث تشدید اثر تضعیف کنندگی این دارو بر روی CNS میشود.
- قبل از قطع دارو با پزشک مشورت نمایید و از قطع ناگهانی مصرف دارو خودداری کنید.

در صورت مصرف دارو ۳ نوبت در روز، توجه نمایید که فاصله ۲ دوز بیشتر از ۱۲ ساعت نشود.

در صورت فراموش کردن یک دوز به محض به یاد آوردن آن را مصرف ننمایید. اگر کمتر از ۴ ساعت تا دوز بعدی باقی مانده، دوز فراموش شده را مصرف نکرده و به برنامه منظم خود برگردید. اجازه ندهید که فاصله دو دوز از ۱۲ ساعت بیشتر شود. اگر این مورد اتفاق افتاد به پزشک خود اطلاع دهید.

- جهت بررسی پیشرفت بیماری به صورت مرتب با پزشک خود ملاقات ننمایید.
- داروها را کمتر و یا بیشتر از میزان تجویز شده توسط پزشک مصرف نکنید.

موارد منع مصرف:

- در موارد زیر نسبت اثرات مفید دارو به عوارض آن باید در نظر گرفته شود:
- حساسیت به گاباپنتین و یا هر یک از اجزای این دارو.
- اختلال عملکرد کلیوی.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌گردد. مگر با تجویز پزشک و زمانی که اثرات سودمند دارو بر مضرات آن ارجحیت داشته باشد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

بزرگسالان: اثر ضد مرعی:

دوز اولیه ۳۰۰ میلی‌گرم ۳ بار در روز.

دوز دارویی براساس میزان پاسخ دهی بیمار نسبت به دارو افزایش می‌یابد و دوزهای ۹۰۰ تا ۱۸۰۰ میلی‌گرم در روز در بسیاری از بیماران موثر است و دوزهای ۲۴۰۰ تا ۳۶۰۰ میلی‌گرم در روز نیز توسط بیمار به خوبی تحمل می‌گردد. اگر در برنامه درمانی روزانه مصرف سه دوز تجویز شده است نباید فاصله هیچ

دو دوزی بیش از ۱۲ ساعت باشد.

اثر ضد مرعی محیطی دهانی: دوز اولیه ۹۰۰ میلی‌گرم در روز میباشد که تا ۳۶۰۰ میلی‌گرم قابل افزایش است.

اثر ضد دردی بعد از بیماری (postherpetic neuralgia):

- ابتدا ۳۰۰ میلی‌گرم در روز اول، ۶۰۰ میلی‌گرم (در دو دوز منقسم) در روز دوم و ۹۰۰ میلی‌گرم (در ۳ دوز منقسم) در روز سوم.
- میزان دارو تا ۱۸۰۰ میلی‌گرم در روز ممکن است افزایش یابد.
- حداکثر دوز روزانه در بزرگسالان: ۳۶۰۰ میلی گرم
- کودکان:

اثر ضد مرعی:

کودکان ۳-۱۲ سال: دوز اولیه باید در محدوده ۱-۱۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز باشد که در سه دوز منقسم تجویز می‌شود و دوز موثر بعد از یک دوره سه روزه تعیین می‌شود.

کودکان ۴-۳ سال: دوز موثر ۴ میلی‌گرم در روز به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز می‌باشد که در سه دوز منقسم تجویز می‌گردد.

کودکان ۵ سال و بالاتر: دوز موثر ۲۵ تا ۳۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن میباشد که به صورت منقسم سه بار در روز تجویز می‌شود.

- حداکثر دوز روزانه در کودکان: ۵۰۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز هر یک از علل زیر با پزشک مشورت گردد.

عوارضی که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:

عوارض با شیوع بیشتر: ناهماهنگی حرکتی، حرکات غیر عادی کره چشم.

عوارض با شیوع بیشتر در کودکان ۳-۱۲ سال: اختلالات روانی مانند احساسات ناپایدار، خشونت، پیش فعالی، اختلالات فکری.

عوارض با شیوع کمتر: فراموشی، افسردگی، تحریک پذیری، درد و تورم دست و پا، لکوکپنی.

عوارض زیر تنها در صورت تداوم یا آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:

عوارض با شیوع بیشتر: تفکرات غیر عادی، ضعف، اسهال، گیجی، خستگی، تب، عفونت، درد عضلانی، ادم محیطی، خواب آلودگی، لرزش، عفونت ویروسی، دو بینی.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری ننمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری ننمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری ننمایید.

بسته بندی:

کپسول گاباپنتین ۱۰۰ میلی‌گرم به صورت ۱۰ پلیستر - عددی در یک جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

L-C123-02

Reference:

1- USPDI, 2007, 27th edition, Vol 2, pages: 1482-6



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Mahsuos Road, Tehran 139834111 - IRAN www.ramopharmin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا،
خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۲۰ - ۴۴ ۵۳ ۶۰ - ۲۱ - ۴۴ ۵۰ ۳۵ ۵۰ - ۲۱