



## اس امپرازول ۲۰ و ۴۰ کپسول

### ■ کودکان:

ایمنی و اثربخشی دارو به غیر از درمان رفلکس معده به مری به اثبات نرسیده است.

درمان کوتاه مدت رفلکس معده به مری:

کودکان ۱۲-۱۷ سال: ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم یک بار در روز تا ۸ هفته.

کودکان زیر ۱۲ سال: ایمنی و اثربخشی دارو به اثبات نرسیده است.

■ دارو را حداقل یک ساعت قبل از غذا میل نمایید.

■ کپسول را به طور کامل بلعیده و از خرد کردن، جویدن یا باز کردن آن خودداری نمایید.

### تداخلات دارویی:

■ کتوکونازول، املام آهن و دیگوسکین (مصرف همزمان ممکن است جذب این دارو را به دلیل تغییرات دستگاه گوارش، تحت تاثیر قرار دهد).

■ وارفارین: مصرف همزمان ممکن است باعث افزایش زمان خونریزی و حتی مرگ ناشی از آن گردد.

### عوارض جانبی:

عوارضی که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:

واکنش‌های آنافیلاکتیک، واکنش‌های پوستی شامل اریتم مولتی فرم، سندرم استیوین جانسون، بیماری toxic epidermal necrolysis، پانکراتیت، عوارضی که در صورت تداوم و آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

عوارض با شیوع بیشتر: سوء هاضمه

عوارض با شیوع کمتر: درد شکم، پیوست، اسهال، گیجی، خشکی دهان، نفخ، سردرد، تهوع، خارش، عفونت تنفسی، سینوزیت.

### سمومیت:

■ در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بیمار را به مراکز کنترل سمومیت منتقل نمایید.

### شرایط نگهداری:

■ دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.

■ دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

■ از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

### بسته بندی:

■ کپسول اس امپرازول ۲۰ و ۴۰ میلی گرمی به صورت ۱۴ عددی داخل شیشه‌های حاوی ماده جذب رطوبت به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

L-C125-01

Reference:

USP DI 2007, 27th edition, Vol 2, drug information for health care professional, pages: 1283-6

### راهنمای‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

### قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت کنید:

■ حساسیت به اس امپرازول، امپرازول یا سایر ترکیبات بنزیمیدازول‌ها

■ استفاده از سایر داروها خصوصاً وارفارین.

■ مصرف در بارداری و شیردهی.

■ مصرف در کودکان و سالمندان.

### هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه کنید:

■ دوره درمان را کامل نمایید.

■ جهت بررسی روند بیماری به طور مرتب با پزشک ملاقات نمایید.

■ هنگام مصرف همزمان اس امپرازول با داروهای آموکسی سیلین و کلاریترومایسین، در صورت بروز اسهال شدید به پزشک خود اطلاع دهید.

■ در صورتی که یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد فقط آن نوبت را مصرف کنید و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

### موارد منع مصرف:

مصرف این دارو در موارد زیر به جز در شرایط ویژه ممنوع است:

■ حساسیت به اس امپرازول و یا هریک از اجزای فرمولاسیون، حساسیت به امپرازول و یا سایر ترکیبات بنزیمیدازول‌ها.

■ نارسایی کبدی.

### مصرف در بارداری و شیردهی:

■ مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در انسان صورت نگرفته است لذا این دارو می‌بایست در دوران بارداری فقط در صورت نیاز مصرف شود.

■ انتشار این دارو به درون شیر مشخص نشده، لذا تجویز دارو تحت نظر پزشک و با توجه به منافع دارو نسبت به مضرات احتمالی آن صورت می‌گیرد.

### مقدار و نحوه مصرف دارو:

■ بزرگسالان:

درمان رفلکس معده به مری: ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم خوراکی، یک بار در روز به مدت ۴ تا ۸ هفته، در صورت نیاز طول مدت درمان توسط پزشک افزایش می‌یابد.

درمان نگهدارنده در ازوفائیت فرسایشی: ۲۰ میلی گرم یک بار در روز به صورت خوراکی.

درمان زخم‌های دوازدهه همراه با هلیکوباکتر پیلوری:

رژیم سه دارویی شامل ۴۰ میلی گرم اس امپرازول یک بار در روز همراه با ۱۰۰۰ میلی گرم آموکسی سیلین دوبار در روز و ۵۰۰ میلی گرم کلاریترومایسین دو بار در روز به مدت ۱۰ روز.

■ کاهش ریسک زخم معده ناشی از مصرف داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی: ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم یک بار در روز که در صورت نیاز درمان تا شش ماه ادامه می‌یابد.



ساخت شرکت داروسازی راموفارمین  
تهران - ایران