



دیکلوفناک سدیم پیوسته رهش ۱۰۰ میلی گرم کپسول

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه‌ی آن به دیگران خودداری ننمایید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- وجود هرگونه حساسیت به دیکلوفناک سدیم یا سایر داروهای مشابه، اجزای تشکیل دهنده این دارو، مواد دیگر از قبیل رنگها، غذاها و مواد نگهدارنده.
- ابتلا به بیماری‌های قلبی، کبدی، کلیوی، اختلالات و خونریزی‌های گوارشی، دیسکراسی خونی و سایرین مغز استخوان.
- در صورت نیاز به جراحی، پزشک یا دندانپزشک خود را از مصرف دارو مطلع نمایید.
- بارداری و شیردهی.
- افراد مسن.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه کنید:

- دارو را بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف ننمایید.
- جهت درمان آرتريت دوره مصرف دارو را کامل کنید زیرا ظهور اثر دارو از چند روز تا بیش از ۲ هفته (در موارد شدید) زمان نیاز دارد.
- چنانچه دارو را ۱-۲ نوبت در روز مصرف می‌کنید در صورت فراموشی یک نوبت از دارو، اگر ۱-۲ ساعت بعد به یاد آورید فوراً دارو را مصرف نمایید، در غیر این صورت آن مصرف آن مصرف نظر کنید.
- چنانچه دارو را بیش از ۱ نوبت در روز مصرف می‌کنید در صورت فراموشی یک نوبت از دارو، به محض یادآوری آن را مصرف ننمایید مگر اینکه زمان مصرف دوز بعدی رسیده باشد، در این صورت مقدار مصرف دارو را ۲ برابر نکنید.
- در مصرف طولانی مدت به طور منظم با پزشک خود ملاقات کنید.
- در صورت بروز عوارضی مانند ادم، خونریزی گوارشی، مشکلات قلبی، افزایش غیر معمول وزن و راش پوستی سریعاً به پزشک اطلاع دهید.
- در صورت بروز علائم شبه آنفولانزا در مدت کوتاه یا بدون علائم دیگری مانند راش پوستی فوراً به پزشک اطلاع دهید، ندرتاً این علائم می‌تواند نشانه حساسیت شدید به دارو باشد.

موارد منع مصرف:

- حساسیت شدید به دارو و یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده آن.
- درمان دردهای عمل جراحی بای پس عروق کرونر.
- ابتلا به بیماری‌ها و مشکلات زمینه‌ای نظیر دیسکراسی خونی، پورفیریای کبدی، سایرین مغز استخوان.
- بیماران با محدودیت مصرف سدیم.
- بیمارانی که به دنبال مصرف آسپرین و سایر داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی علائمی مانند آسم، رینیت، کهیر، پلپ بی، آنژیوادم، برونکواسپاسم و دیگر نشانه‌های واکنش‌های آلرژیک و آنافیلاکتیک را تجربه کردند.

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو و همانند سایر داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی در سه ماه دوم و سوم بارداری توصیه نمی‌شود.
- همچنین به دلیل ترشح این دارو در شیر مادر، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- بعد از مشاهدۀ پاسخ به درمان اولیه با این دارو، دوز دارو و تناوب مصرف آن با توجه به ویژگی‌های فردی بیمار توسط پزشک تعیین می‌گردد.
- مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

بزرگسالان:

- استاندارت: ۱۰۰ میلی گرم یک بار در روز.
- آرتريت روماتوئید: ۱۰۰ میلی گرم یک بار در روز که ممکن است به ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز نیز افزایش یابد.

کودکان:

- ایمنی و اثربخشی این دارو در کودکان به اثبات نرسیده است.
- دارو را با یک لیوان پر از آب ننمایید.
- دارو را بعد از غذا مصرف ننمایید.
- دارو را به طور کامل بلعید و از خرد کردن، جویدن و یا باز کردن آن خودداری ننمایید.

تداخلات دارویی:

مهارکننده‌های ACE (مانند کاپتوپریل، انالاپریل، لیزینوپریل و...)، آسم‌ناهی‌ها، مکمل‌های حاوی پتاسیم، کورتیکواستروئیدها، گلوکوکورتیکوئیدهای خوراکی، داروهای ضد انعقاد مانند هپارین، دیگوکسین، داروهای ترومبولیتیک مانند استریتوکیناز، وارفارین، داروهای ضد دیابت، انسولین، داروهای ضد فشارخون، داروهای مدر مانند تریامترن، آسپرین، واپسرونیک اسید، کلوشی سین، سیکلوسپورین، لیتیم، متوتروکسات، زپرونسید، ایندومتاسین و سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی.

عوارض جانبی:

- هردارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:
- گیجی، سردرد، خواب آلودگی، زوز گوش، راش پوستی و خارش، تهوع و استفراغ، درد شکمی، سوء هاضمه، پیوسته یا اسهال، نفخ شکم، آریتمی قلبی، درد قفسه سینه.
- عوارضی که در صورت بروز نیاز به قطع مصرف دارو و مراجعه به پزشک دارند:
- خونریزی گوارشی، شوک آنافیلاکتیک، آنژیوادم، برونکواسپاسم.

مسمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را سریعاً به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

- کپسول دیکلوفناک سدیم پیوسته رهش ۱۰۰ میلی گرم به صورت ۵ پیوسته ۱ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

L-C42130-01

References:

1) USPDI 2007, 27th Edition, Vol 1, Drug information for health care professional, pages: 379-392

2) Drug facts and comparisons 2015, Vol 2. pages: 1427-70



معاونت شرکت داروسازی راموفارمین
تهران - ایران