



**دوکسپین ۱۰ و ۲۵ میلی گرم
کپسول**

■ به دلیل احتمال گیجی یا سرگیجه هنگام بلند شدن از حالت نشسته یا خوابیده احتیاط کنید.
■ ۳ تا ۷ روز بعد از قطع دارو موارد احتیاط را رعایت کنید.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید، ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار ذیل می‌باشد:

بزرگسالان:

درمان خارش: دوز اولیه ۱۰ میلی گرم هنگام خواب که می‌تواند در صورت نیاز تا ۲۵ میلی گرم نیز افزایش یابد.

ضد افسردگی: دوز اولیه ۲۵ میلی گرم سه بار در روز می‌باشد که بسته به نیاز و تحمل بیمار تدریجاً مقدار مصرف تعیین می‌گردد.

کودکان:

■ مصرف این دارو در کودکان زیر ۱۲ سال ارزیابی نشده است.
■ **سالمدان:**

■ دوز اولیه ۲۵ تا ۵۰ میلی گرم در روز است که بسته به نیاز و تحمل بیمار تدریجاً مقدار مصرف تعیین می‌گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است موجب بروز برخی عوارض ناخواسته گردد. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

عوارضی که نیاز به توجه پزشکی دارند:

عوارض با شیوع کم: تاری دید، پیوست، ضربان قلب نامنظم، لرزش و علائم پارکینسون و اختلال در فعالیت جنسی.

عوارض نادر: اگرانولوسیتوز، واکنشهای آلرژیک، طاسی، اضطراب، بزرگی پستان در مردان و زنان و گالاکتوره، یرقان صفراوی، تشنج، و وزوز گوش.

در صورت تداوم و یا ایجاد مزاحمت عوارض زیر به پزشک مراجعه گردد:

عوارض شایع: خواب آلودگی، خشکی دهان، سردرد، افزایش اشتها، تهوع، افت فشارخون به هنگام برخاستن، ضعف، خستگی و افزایش وزن.

عوارض با شیوع کم: اسهال، افزایش تعریق، اشکال در خوابیدن، استفراغ، سوزش معده.

قطع ناگهانی دارو باعث بروز عوارضی همچون سردرد، تهوع، استفراغ، اسهال، هيجان عريم معمول و اشکال در به خواب رفتن می‌گردد.

■ در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

■ دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری گردد.

■ دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

■ از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

بسته بندی:

■ کپسول دوکسپین ۱۰ و ۲۵ میلی گرم، به صورت ۳ پلیستر ۱۰ عددی در یک جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

راهنمای‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف دارو در موارد زیر با پزشک مشورت کنید:

■ حساسیت به داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای، ماپروتیلین، ترازودون.

■ مصرف سایر داروها به خصوص تضعیف کننده‌های اعصاب مرکزی، داروهای ضد تیرئوید، سایمتیدین، کلونیدین، گوانتیدین، فنوتیازین‌ها، مهارکننده های آنزیم مونوآمین اکسیداز، متیرامید، داروهای سمپاتومیمتیک.

■ در صورت ابتلا، به بیماریهایی مانند: اختلالات خونی، بیماریهای قلبی - عروقی، ناراحتیهای گوارشی، گلوکوم، آسم، پرکاری تیروئید، نارسایی کلیوی و کبدی، مرع، شیزوفرنی و الکلیسم، هایپرتروفی پروستات، اختلالات دوقطبی.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه کنید:

■ جهت کاهش عوارض گوارشی دارو، این دارو همراه با غذا میل شود.

■ دارو را کمتر یا بیشتر از میزان توصیه شده توسط پزشک مصرف ننمایید.

■ ممکن است اثرات ضد افسردگی این دارو ۱ الی ۶ هفته بعد از مصرف آن حاصل گردد.

■ چنانچه مصرف یک نوبت دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن آن را مصرف ننمایید، اما اگر زمان مصرف نوبت بعدی رسیده است دوز فراموش شده را مصرف نکنید و از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری نمایید.

■ در طول مصرف دارو تحت نظر پزشک معالج باشید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

■ مطالعات کنترل شده مناسبی در دوران بارداری بر روی انسان انجام نشده است و در مواردی گزارش شده است که مصرف دارو در دوران شیردهی باعث ایجاد خواب آلودگی و ایست تنفسی در کودکان شیرخوار می‌گردد.

هشدارها:

■ مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی گردد، لذا در طول مصرف این دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.

■ مصرف این دارو ممکن است باعث خشکی دهان گردد، جهت رفع این عارضه می‌توانید از آب نبات و یا آدامسهای فاقد قند استفاده نمایید.

■ در صورتیکه مصرف دارو بیش از ۲ هفته ادامه یافت جهت معاینات دهان و دندان به دندانپزشک یا پزشک معالج مراجعه نمایید.

■ مصرف این دارو ممکن است باعث حساسیت به نور شود، لذا ضمن درمان از قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید جلوگیری نمایید و از کرم‌های ضد آفتاب مقاوم در برابر UV-A و UV-B استفاده کنید.

■ از قطع ناگهانی دارو بدون مشورت با پزشک خودداری کنید.

■ از مصرف فرآورده‌های الکلی خودداری نمایید.

■ سایر داروها را بدون تجویز پزشک مصرف نکنید.

