

کپسول زینک ۵۰ میلی گرم (به صورت سولفات روی هپتاهیدرات ۲۲۰ میلی گرم)

راهنمای‌های عمومی برای مصرف صحیح فرآورده:

- این فرآورده مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌ها نمی‌باشد.
- وجود میزان کافی زینک برای رشد نرمال و ترمیم بافت‌های بدن ضروری است.
- وجود زینک مکمل عمل آتزانیم‌هایی است که در متابولیسم گریبوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها نقش دارند.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

- فرآورده را بیش از مقدار توصیه شده مصرف نکنید، اگر مقدار مصرف در یک دوز بیش از ۲ گرم باشد باعث استفراغ خواهد شد.
- این فرآورده با دوز بالا می‌باشد و با توجه به اینکه ۲۵ درصد بالاتر از حداکثر مقدار مجاز روزانه است، می‌بایستی حتماً با مشورت پزشک یا داروساز مصرف شود.

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این فرآورده در بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود.

مورد مصرف:

- کمک به سلامت پوست، مو و ناخن، کمک به سلامت سیستم ایمنی.

مقدار و نحوه مصرف فرآورده:

به عنوان مکمل:

- بزرگسالان: ۵۰ میلی‌گرم روزانه (به صورت زینک المتال)
- برای کاهش عوارض گوارشی فرآورده را بعد از غذا میل نمایید.

تداخلات دارویی:

- مصرف همزمان این فرآورده با فلوروکینولون‌ها (سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین و ...) و تتراسایکلین‌ها باعث کاهش جذب داروهای مذکور می‌شود.

- مصرف همزمان این فرآورده با پنی سیلیمین، ترکیبات حاوی آهن و فسفر و برخی غذاها (سبوس، پرتوتین، مواد معدنی) ممکن است باعث کاهش جذب زینک گردد.

عوارض جانبی:

هر فرآورده به موزات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

درد شکم، سو، هاضمه، تهوع، استفراغ، اسهال، زخم‌های گوارشی.

مسمومیت:

- در صورت اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را سریعاً به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- فرآورده دوزان نور، رطوبت و دردمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری گردد.
- فرآورده دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

- کپسول زینک ۵۰ میلی‌گرم (زینک سولفات هپتاهیدرات ۲۲۰ میلی گرم) به صورت ۱۰ پلیستر ۱۰ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای فرآورده بسته بندی می‌گردد.

References:

- 1) Martindale 2009, 36th Edition, page: 1999-2001
- 2) Drug Facts and Comparisons 2015, Vol 1, page: 67-68
- 3) British national formulary 68, 2015, pages: 686-7



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Maksuoss
Road, Tehran 13 98 83 41 11 - IRAN www.ramopharm.in.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا،
خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۰۲۰ ۶۳۵۶۰۴۴ - ۰۲۱ ۴۴۵۰۳۵۵۰ - ۰۲۱ ۴۴۵۰۳۵۵۰