



زینک سولفات

محلول خوراکی

فیبردار، ترکیبات حاوی آهن و فسفر ممکن است باعث کاهش جذب زینک گردد. مصرف همزمان این فرآورده با تتراسایکلین ها و فلوروکینولون ها (مانند سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین) ممکن است باعث کاهش جذب داروهای مذکور گردد.
 ■ در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده ها/داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

■ هر فرآورده به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هر یک از عوارض نادری همچون اختلالات گوارشی به ویژه سو، هاضمه، سوزش سردل، تهوع و استفراغ با پزشک مشورت نمایید.

مسمومیت:

■ در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد توصیه شده بیمار را سریعاً به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

■ فرآورده دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
 ■ فرآورده در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت گردد.
 ■ فرآورده را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

بسته بندی:

■ فرآورده در شیشه دارویی قهوه ای رنگ ۱۲۰ میلی لیتری با درب پیلفرپروف و پیمانه در یک جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می گردد.

■ هر ۵ میلی لیتر از فرآورده حاوی ۴۴ میلی گرم زینک سولفات هپتاهیدرات است که معادل ۱۰ میلی گرم زینک به صورت الامتال می باشد.
 ■ این فرآورده صرفاً مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری نمی باشد.

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح فرآورده:

■ بیش از مقدار تجویز شده مصرف ننمایید.
 ■ در صورت ایجاد ناراحتی گوارشی می توانید این فرآورده را همراه غذا میل نمایید.
 ■ در صورت داشتن هر نوع آلرژی یا حساسیت با پزشک خود مشورت نمایید.
 ■ در صورت باز بودن درپوش فرآورده یا آسیب آن از مصرف فرآورده خودداری نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

■ مصرف این فرآورده در بارداری و شیردهی باید زیر نظر پزشک متخصص صورت گیرد.

مقدار، مورد و نحوه مصرف فرآورده:

■ کمک به سلامت پوست، مو، ناخن و کمک به سلامت سیستم ایمنی.
 ■ مصرف این فرآورده به عنوان مکمل موجب حفظ عملکرد مناسب فعالیت های وابسته به زینک در بدن می گردد.
 ■ مقدار مصرف براساس سن و جنس تعیین می گردد. برای اطلاعات بیشتر به جدول ذیل مراجعه و یا با پزشک خود مشورت نمایید.

تداخلات دارویی:

■ مصرف همزمان این فرآورده با پنی سیل آمین، مواد غذایی

L-S138-02

سن و جنس	مقدار مجاز توصیه شده روزانه محلول خوراکی بر اساس میلی لیتر	
	۵/۵	۱۱
مردان	۵/۵ سال	۱۱ سال
	۴/۵ سال	۹
	۴ سال	۸
	۶ سال	۱۲
زنان	۵/۵ سال	۱۱
	۶/۵ سال	۱۳
	۶ سال	۱۲
	۲/۵ سال	۵
کودکان	۴ سال	۸
	۱۳ تا ۹ سال	

References:

1) Martindale, The Complete Drug References 2009, 36 th edition
 2) www.updodate.com



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

Voliasar Ave, Shishe sazi Mino St, km 4 Karaj Makhsuos Road, Tehran 13 98 83 41 11 - IRAN www.ramopharm.com
 Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی میثا،
 خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
 تلفن: ۲۴ - ۶۰ ۴۴ ۵۳ ۶۰ ۲۱ - ۲۴ ۵۰ ۳۵ ۵۰ ۴۱ - ۲۴ ۵۰ ۳۵ ۵۰ ۴۱