هیدروکلروتیازید ۲۵ و ۵۰ میلی‌گرم
قـرص

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

■ این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه‌ی آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

■ حساسیت به دیورتیک‌های تیازیدی، دیگر داروهای سولفونامیدی، بومتانید، فوروزماید یا مهارکننده‌های کربونیک انهیدراز.

■ در صورت بارداری و شیردهی.

■ استفاده در کودکان و افراد مسن.

■ استفاده از سایر داروها خصوصا کلستیرامین، کلستیپول، گلیکوزیدهای دیجیتالی یا لیتیم.

■ وجود بیماری ها خصوصا بی اداری یا اختلال شدید عملکرد کلیه، نوزادان با زردی.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

■ در صورت فراموشی یک دوز به محض به یادآوردن آن را مصرف نمایید. اگر زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده است از مصرف دوز فراموش شده صرف‌نظر کرده و دوز دارو را دو برابر نکنید.

■ در صورت استفاده به عنوان داروی ضد فشارخون بالا، رعایت رژیم غذایی اهمیت دارد. ممکن است که نیاز به کاهش مصرف سدیم و یا کاهش وزن باشد.

■ بیمار ممکن است که نشانه‌های فشارخون بالا را نداشته باشد. در هر صورت نیاز است که دارو مصرف گردد.

■ به دلیل احتمال کاهش پتاسیم ممکن است که نیاز به مصرف پتاسیم اضافی در رژیم غذایی باشد. قبل از مشورت با پزشک، رژیم غذایی خود را تغییر ندهید.

■ بدون مشورت با پزشک داروی دیگری استفاده نکنید، خصوصا سمپاتومیمتیک‌های غیر نسخه‌ای.

■ از قرارگیری بیش از حد در معرض خورشید یا لامپ آفتابی خودداری کنید.

موارد منع مصرف:

در موارد زیر نسبت اثرات مفید دارو به عوارض آن باید در نظر گرفته شود:

■ بی اداری یا اختلال شدید عملکرد کلیوی.

■ استفاده در کودکان با زردی به دلیل احتمال هایپربیلی روبینمی.

مصرف در بارداری و شیردهی:

■ مصرف این دارو در بارداری باید تحت نظر پزشک باشد. به دلیل ترشح این دارو در شیر مصرف در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

■ **بزرگسالان:**

دیورتیک: ۲۵ - ۱۰۰ میلی‌گرم به صورت خوراکی یک یا دو بار در روز به صورت یک روز درمیان، یا یک بار در روز، ۳-۵ روز در هفته.

درمان فشارخون بالا: ۲۵-۱۰۰ میلی‌گرم به صورت خوراکی در روز، در یک دوز واحد یا دو دوز، که دوز دارو براساس پاسخ بیمار تنظیم خواهد شد.

■ **کودکان:**

۱ - ۲ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن یا ۳۰ - ۶۰ میلی‌گرم به ازای هر متر مربع از سطح بدن در یک دوز واحد یا دو دوز در روز که دوز براساس پاسخ بیمار تنظیم می‌شود.

تداخلات دارویی:

■ کلستیرامین، کلستیپول، گلیکوزیدهای دیجیتالی، لیتیم.

عوارض جانبی:

■ هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید.

■ **عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:**

عوارض با شیوع بیشتر: عدم تعادل الکترولیت‌ها مانند هایپوناترمی، hypochloremic alkalosis, هایپوکالمی.

عوارض نادر: آگرانولوسیتوزیس، واکنش‌های حساسیتی، التهاب کیسه صفرا یا پانکراتیت، نقرس یا هایپراوریسمی، اختلال عملکرد کبدی، ترومبوسایتوپنی.

■ **عوارضی که در صورت تداوم یا آزار دهنده بودن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:**

عوارض با شیوع کمتر: بی‌اشتهایی، کاهش توانایی جنسی، اسهال، افت فشارخون وضعیتی، حساسیت به نور، ناراحتی معده.

مسمومیت:

■ در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

■ دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.

■ دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

■ قرص هیدروکلروتیازید ۲۵ و ۵۰ میلی‌گرم به صورت ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته‌بندی می‌گردد.

Reference:
1)USPDI 2007 ,27" Edition, Vol 2, Drug information for health care professional, pages: 1127 -1133

ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا، خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۲۰ ۶۰ ۵۳ ۴۴ - ۰۲۱ نمابر: ۵۰ ۳۵ ۵۰ ۴۴ - ۰۲۱

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsuos Road, Tehran 13 98 83 41 11 - IRAN www.ramopharmin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50