



فاموتیدین ۲۰ و ۴۰ میلی گرم قرص روکش دار خطدار

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیفی آن به دیگران خودداری ننمایید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- حساسیت به هریک از آنتاگونیست‌های گیرنده‌ی هیستامینی H_2
- در صورت بارداری و شیردهی،
- استفاده در افراد مسن.
- استفاده از سایر داروها خصوصاً اینتراکونازول، کنتوکونازول، ضد انعقادها، متوپرولول، فنی تونین، گزانتین‌ها و پروپرانولول.
- وجود بیماری‌های خصوصاً اختلال عملکرد کلیوی.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه کنید:

- دوره درمان را کامل کنید.
- در صورت فراموشی یک دوز به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید.
- اگر زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن صرف نظر کرده و دوز دارو را دو برابر نکنید.

موارد منع مصرف:

- مصرف دارو در موارد زیر به جز در شرایط ویژه ممنوع است:
- حساسیت به هریک از آنتاگونیست‌های گیرنده‌ی هیستامینی H_2
- در موارد زیر نسبت اثرات مفید دارو به عوارض آن باید در نظر گرفته شود:
- اختلال عملکرد کلیوی.

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید تحت نظر پزشک باشد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

■ بزرگسالان

■ زخم دوازدهه:

درمان: ۴۰ میلی گرم یک بار در روز، شب هنگام خواب یا ۲۰ میلی گرم دو بار در روز، به صورت خوراکی.
پیشگیری از زخم دوازدهه راجعه: ۲۰ میلی گرم یک بار در روز، شب هنگام خواب، به صورت خوراکی.
زخم معده خوش خیم و فعال:
درمان: ۴۰ میلی گرم یک بار در روز، شب هنگام خواب، به صورت خوراکی.
سوزش سر دل، ترش کردن معده:
درمان: ۱۰ میلی گرم به صورت خوراکی در زمان شروع علائم. دوز دارو ممکن است در ۲۴ ساعت یک بار تکرار شود.
پیشگیری: ۱۰ میلی گرم به صورت خوراکی تا ۱ ساعت قبل از مصرف آشامیدنی یا غذایی که انتظار می‌رود باعث بروز علائم شود.

در شرایط افزایش اسید معده:

۲۰ میلی گرم هر ۶ ساعت به صورت خوراکی. دوز براساس نیاز بیمار تنظیم می‌شود و درمان تا زمان وجود علائم بالینی ادامه می‌یابد.

رفلاکس معده به مری:

۲۰ میلی گرم به صورت خوراکی، ۲ بار در روز که تا ۶ هفته ممکن است ادامه یابد.

■ کودکان

■ زخم دوازدهه و معده:

در ابتدا ۵/۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن روزانه، شب هنگام خواب یا در دو دوز منقسم.

■ رفلاکس معده به مری:

کودکان با وزن بیشتر از ۱۰ کیلوگرم: ۲-۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن روزانه، در دو دوز منقسم.

کودکان با وزن کمتر از ۱۰ کیلوگرم: ۱-۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن روزانه، در سه دوز منقسم.

تداخلات دارویی:

اینتراکونازول، کنتوکونازول، ضد انعقادها، ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای، متوپرولول، فنی تونین، پروپرانولول، گزانتین‌ها.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

عوارض نادر: آریتمی قلبی، واکنش‌های پوستی، تب، مشکلات خونی مانند آنمی، مشکلات کبدی مانند هپاتیت، واکنش‌های حساسیتی، تغییرات خلقی، درد عضلانی، آگرانولوسیتوزیس، درد مفاصل، ضعف، برونکواسپاسم، خستگی، تپش قلب.

عوارضی که در صورت تداوم یا آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

عوارض با شیوع کمتر یا نادر: کاهش میل جنسی، اسهال، گیجی، بزرگی و دردناک شدن سینه در مردان و زنان، سردرد، ناتوانی جنسی، خواب‌آلودگی، درد شکم، ریزش مو، بی‌اشتهایی، بی‌هوشی، خشکی دهان، خشکی پوست، بی‌خوابی، تهوع، وزوز گوش و استفراغ.

مسمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

- قرص فاموتیدین ۲۰ و ۴۰ میلی گرم به صورت ۳ بلیستر ۱ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران