

لیپورام[®]فنوفیبرات ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم
کپسول

درمان هیپرتری گلیسریدی: یک کپسول روزانه به صورت خوراکی. دوز دارو براساس پاسخ بیمار تنظیم می‌گردد.
کودکان
ایمنی و اثربخشی در کودکان به اثبات نرسیده است.

تداخلات دارویی:

■ ضد انعقادها، سیکلوسپورین، داروهای نفروتوکسیک، مهارکننده‌های HMG-CoA reductase (مانند آتورواستاتین).

عوارض جانبی:

■ هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید.
■ عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:
عوارض با شیوع کمتر: علائم آنفولانزا، عفونت، خارش، راش پوستی و یا کهیر.
عوارض نادر: آگرانولوسیتوزیس، التهاب الکول ها، آلرژی، آماس کیسه صفرا، سنگ کیسه صفرا، آگزما، سمیت کبدی، علائم اسکلتی عضلانی مانند درد عضله، ضعف عضلانی، آماس ماهیچه ها و یا رابدومیولیز، پانکراتیت، ترومبوسیتوپنی.
■ عوارضی که در صورت تداوم یا آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:
عوارض با شیوع بیشتر: اختلال تنفسی.
عوارض با شیوع کمتر: درد شکم، ضعف، درد پشت، اسهال، گیجی، سوزش چشم، علائم گوارشی مانند آروغ زدن، یبوست، نفخ، سردرد، کاهش تمایلات جنسی، تهوع، حساسیت به نور، رینیت.

سمومیت:

■ در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

■ دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.
■ دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

■ کپسول لیپورام ۱۰۰ و ۲۰۰ به صورت ۱۰ پلیستر ۱۰ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

راهتمایهای عمومی برای مصرف صحیح دارو:

■ این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا پرمیوه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

■ حساسیت به فنوفیبرات.
■ وجود تومور بدخیم کبدی و تومورهای خوش خیم لوزالمعده.
■ در صورت بارداری و شیردهی.
■ استفاده در افراد مسن.
■ استفاده از سایر داروها خصوصاً ضد انعقادها، سیکلوسپورین یا مهارکننده‌های HMG-CoA reductase.
■ بیماری‌های دیگر خصوصاً بیماری‌های کیسه صفرا، اختلال عملکرد کبدی شامل سیروز صفراوی اولیه و اختلالات غیر عادی عملکرد کبد، اختلال شدید عملکرد کلیوی.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه کنید:

■ دوره درمان را کامل کنید. جهت حفظ اثرات درمانی دارو را هر روز در زمان مشخص مصرف نمایید. دارو را بیشتر و یا کمتر از مقدار تجویز شده مصرف ننمایید.
■ دارو را همراه یا بعد از غذا میل ننمایید.
■ در صورت فراموشی یک دوز به محض یادآوری آن را مصرف ننمایید، در صورتی که زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده بود از مصرف آن صرف نظر کرده و دوزها را دو برابر نکنید.
■ جهت بررسی روند پیشرفت درمان به طور مرتب با پزشک خود ملاقات کنید.
■ در صورت ایجاد درد عضلانی بدون علت، ضعف یا التهاب به خصوص همراه با خستگی یا تب غیرعادی فوراً به پزشک خود اطلاع دهید.

موارد منع مصرف:

■ مصرف این دارو در موارد زیر به جز در شرایط ویژه ممنوع است:
■ بیماری‌های صفراوی که از قبل وجود داشته اند.
■ اختلال عملکرد کبدی.
■ حساسیت به فنوفیبرات.
■ اختلال شدید عملکرد کلیوی.

مصرف در بارداری و شیردهی:

■ مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

■ بزرگسالان
درمان هیپرتری گلیسریدی: یک کپسول روزانه به صورت خوراکی.

References:
1) USPDI 2007, 27th Edition, Vol 2, Drug information for health care professional, pages: 1363-8



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Mahkous Road, Tehran 13 98 83 41 11 - IRAN www.ramopharm.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا،
خیابان ولیعصر، رویروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۲۰ - ۶۰ ۴۴ ۲۱ - ۵۰ ۳۵ ۴۴ ۵۰ - ۵۰ ۴۴ ۲۱