



کلیدینیوم - سی

کلیدینیوم بروماید ۲/۵ میلی گرم / کلردیازپوکساید ۵ میلی گرم
قرص روکش دار خط دار

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

- بزرگسالان
- اختلالات گوارشی
- یک یا دو قرص ۳-۴ بار در روز
- دارو را قبل از غذا میل نمایید.

تداخلات دارویی:

■ داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی، داروهای آنتی کولینرژیک، کتوکونازول، پیتاسیم کلراید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موالات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید.

- ناهماهنگی حرکت عضلات، گیجی، خواب آلودگی، بیوست، تهوع، خشکی دهان، عوارض آنتی کولینرژیک

مسمومیت:

■ در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری گردد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

پسته بندی:

■ قرص کلیدینیوم - سی به صورت ۵ پلیستر ۲۰ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می گردد.

راهنمای‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

■ این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه ی آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- در صورت حساسیت به کلیدینیوم، کلردیازپوکساید و یا هر یک از اجزای این دارو
- در صورت بارداری و شیردهی
- در صورت ابتلا به بیماری ها خصوصاً افسردگی، اختلالات کبدی و کلیوی، بیماری های تنفسی

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

- مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی یا تاری دید گردد، لذا در طول درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری گردد.
- دارو را بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف ننمایید.
- در صورت فعالیت شدید در هوای گرم احتمال بالا رفتن دمای بدن وجود دارد.
- در صورت فراموشی یک دوز دارو، در صورت به یاد آوردن در حدود یک ساعت بعد، آن را مصرف کنید در غیر این صورت از مصرف آن صرف نظر کرده و دوز بعدی را دو برابر نکنید.
- در صورت ایجاد وابستگی فیزیکی یا ذهنی با پزشک خود ملاقات نمایید.
- در صورت استفاده طولانی مدت یا با دوز بالا، قبل از قطع دارو با پزشک خود ملاقات نمایید.

موارد منع مصرف:

مصرف دارو در موارد زیر به جز در شرایط ویژه ممنوع است:

- در صورت حساسیت به کلیدینیوم، کلردیازپوکساید و یا هر یک از اجزای این دارو
- در موارد زیر نسبت اثرات مفید دارو به عوارض آن باید در نظر گرفته شود:
- بیماری های قلبی، اختلالات کلیوی، فتق هیاتال همراه رفلاکس از وفاژیت، سابقه وابستگی یا سوء مصرف دارو، ضعف روده، انسداد گوارشی، میاستنی گراویس، گلوکوما، گلویت اولسراتیو، اختلاس ادراری، اختلال شدید تنفسی، اختلالات سایکوتیک

مصرف در بارداری و شیردهی:

■ مصرف این دارو در سه ماه اول بارداری ممنوع است مگر به تشخیص پزشک متخصص.

