



اندانسترون

قرص ۴ میلی‌گرم / محلول خوراکی ۴ میلی‌گرم در ۵ میلی‌لیتر

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری قهلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه‌های آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- حساسیت به اندانسترون و یا هریک از اجزای این دارو
- حساسیت به سایر آنتاگونیست‌های گیرنده $5-HT_3$
- استفاده در کودکان

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه کنید:

- در صورت فراموشی یک دوز، اگر تهوع یا استفراغ اتفاق افتاد به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید.

موارد منع مصرف:

مصرف این دارو در موارد زیر به جز در شرایط ویژه ممنوع است:

- حساسیت به اندانسترون یا هریک از اجزای این دارو
- حساسیت به آنتاگونیست‌های گیرنده $5-HT_3$
- سندروم جینی QT طولانی

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید با نظر پزشک صورت گیرد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- بزرگسالان:

پیشگیری از تهوع و استفراغ (متوسط) ایجاد شده به دنبال شیمی درمانی سرطان: دوز ابتدایی: ۸ میلی‌گرم خوراکی، ۳۰ دقیقه قبل از شیمی درمانی.

بعد از شیمی درمانی: ۸ میلی‌گرم خوراکی، ۸ ساعت بعد از دوز ابتدایی سپس ۸ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت برای ۲-۱ روز.

پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی: ۱۶ میلی‌گرم خوراکی، ۱ ساعت قبل از شروع بیهوشی.

پیشگیری از تهوع و استفراغ ایجاد شده به دنبال پروتو درمانی:

دوز ابتدایی: ۸ میلی‌گرم خوراکی، ۲-۱ ساعت قبل از شروع پروتو درمانی.

بعد از پروتو درمانی: ۸ میلی‌گرم خوراکی، هر ۸ ساعت.

کودکان ۴-۱۱ سال:

پیشگیری از تهوع و استفراغ (متوسط) ایجاد شده به دنبال شیمی درمانی سرطان: دوز شروع: ۴ میلی‌گرم خوراکی، ۳۰ دقیقه قبل از شیمی درمانی.

تداخلات دارویی:

- آمیودارون، آپومورفین، دمیریدون، پیموزاید، ترامادل، ریفامپیسین، کاربامازپین، فنی تونین، آلفا، کئنده‌های آنزیم CYP3A4.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

عوارض نادر: شوک آنافیلاکتیک، برونکواسپاسم، درد قفسه سینه.

عوارضی که در صورت تداوم یا آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

عوارض با شیوع بیشتر: یبوست، اسهال، تب، سردرد.

عوارض با شیوع کمتر: درد شکم، احساس سرما، گیجی، سرگیجه، خشکی دهان، اختلال حس لمس، خارش، راش پوستی، خستگی و ضعف غیرمعمول.

مسمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
- محلول خوراکی: دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت گردد.
- قرص: دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری گردد.

بسته بندی:

محلول خوراکی (۵ میلی‌لیتری حاوی ۴ میلی‌گرم اندانسترون) در یک شیشه دارویی قهوه‌ای رنگ ۶۰ میلی‌لیتری همراه با پیمانه در یک جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

قرص اندانسترون ۴ میلی‌گرم به صورت ۱۰ بلیستر به ۱ عددی در یک جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

References:

- 1) USP DI, 2007, Vol 3, pages: 2180-4
- 2) British national formulary 81, 2021, pages: 454-5
- 3) www.uptodate.com



ساخت شرکت داروسازی راموفامین
تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsoos Road, Tehran 1398834111 - IRAN www.ramophamin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا،
خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۰۲۱ ۴۴ ۵۳ ۰۲۱ - ۴۴ ۵۰ ۳۵ ۰۲۱