



قرص سینتالورامین® ۲۰ و ۴۰

سینتالوپرام

کودکان:

- کودکان ایمنی و کارایی دارو مشخص نشده است.
- دارو را طبق تجویز پزشک، همراه غذا یا با معده خالی مصرف کنید.

تداخلات دارویی:

- داروهای مهارکننده CYP3A4 مانند: کتوکونازول و فلوکونازول، الکل، ضداسفردگی‌های سه حلقه‌ای مانند ایمی پرامین، اسپرین، کاربامازپین، سایمتیدین، لینزولاید، لیتیم، متوپرولول، داروهای مهارکننده MAO، وارفارین، سوماتریپتان و داروهای سروتونرژیک.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

عوارضی که در صورت بروز نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:

عوارض شایع: کاهش میل جنسی، کاهش نیروی جنسی
عوارض با شیوع کمتر: دوبینی، تحریکات هیجانی، از دست دادن حافظه، فقدان احساس یا هیجان، گیجی، تنگی نفس، تب، تغییر عادت ماهیانه، افزایش ادرار، یبورات پوستی یا خارش.

عوارض نادر: خونریزی غیرعادی، ضربان نامنظم قلب، حساسیت سینه و ترشح غیرعادی شیر، آبریزی‌های قلبی، epidermal necrolysis، اثرات اکستراپیرامیدال، افت قند خون، hyponatremia، اختلال در ادرارکردن، اختلالات ذهنی، SIADH

■ **عوارضی که در صورت تداوم و یا آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:**

عوارض شایع: خواب آلودگی، خشکی دهان، بی‌خوابی و تهوع.
عوارض با شیوع کمتر: شکم درد، از دست دادن اشتها، اضطراب، درد ماهیچه و فاسیل، سستی و ضعف غیرطبیعی، اسهال، اختلال در عمل هضم، نفخ، هیپوتانسیون، افزایش بزاق دهان، افزایش تعریق، افزایش خمیازه کشیدن، میگرن، احساس غیرطبیعی مثل سوزش یا گزگز یا احساس راه رفتن مورچه روی پوست، رینیت یا سینوزیت، تغییر ذائقه، سبیش دندان، عفونت دستگاه تنفس فوقانی، لرزش، افزایش یا کاهش غیر طبیعی وزن و استفراغ.

پس از قطع دارو، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک تماس بگیرید:
اضطراب، سرگیجه، لرزش، سردرد، بی‌خوابی، گیجی، احساس ناراحتی، احساسات ناپایدار، زودرنجی، رخوت، حالت عمیقانی، مورمور شدن.

عوارض مصرف بیش از حد دارو:

■ حد:

عوارض شایع: سرگیجه، خواب آلودگی، تهوع، تاکیکاردی سینوسی، تعریق، لرزش، استفراغ.
عوارض نادر: از دست دادن حافظه، گیجی، کما، سینوز، تغییرات ECG، آریتمی پلنی، افزایش غیرطبیعی تهویه ریوی، احساس ناراحتی و بیماری، درد عضلانی و ضعف.

مسمومیت:

- در صورت مصرف بیش از حد دارو بیمار را بلافاصله به بیمارستان مسمومین منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو در جای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری گردد.
- دارو در دسترس کودکان نگهداری گردد.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

بسته بندی:

- قرص‌های سینتالورامین ۲۰ و ۴۰ به صورت ۳ پلیستر ۱۰ عددی در یک جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

L-T113-02

Reference:

USPDI 2007, VOL I, Page: 828-832



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Mahkshous
Road, Tehran 13 98 83 41 11 - IRAN www.ramopharm.com
Tel: +98 21 44 53 60 20-24 Fax: +98 21 44 50 35 50

راهنمای‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- مصرف این دارو در کودکان باید با احتیاط صورت گیرد.
- مصرف این دارو همراه با مهارکننده‌های MAO ممنوع می‌باشد.
- حساسیت به سینتالوپرام یا هریک از اجزای این دارو، رنگها، مواد محافظ و غذاها.
- در صورت بارداری و شیردهی.
- در صورت ابتلا، به بیماریهای نظیر اختلال عملکرد کبدی بیماریهای قلبی.
- به منظور جلوگیری از تاسازگاری دارویی در مورد هر نوع دارو چه با نسخه یا بدون نسخه با پزشک خود مشورت کنید خصوصاً لینزولاید و داروها و مواد با فعالیت سروتونرژیک.
- در افراد مسن توصیه به مصرف دوز کمتر از افراد جوان می‌باشد.
- مصرف این دارو باعث خواب آلودگی و عدم دقت مهارت عملی میشود، لذا ضمن درمان با این دارو از رانندگی و کار با آلتی که نیاز به دقت و حسیاری کامل دارد خودداری نمایید.

هنگام مصرف این دارو به نکات زیر توجه نمایید:

- دوره درمان را کامل نمایید و دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف ننمایید.
- در صورتی که هر نوبت از دارو را فراموش کردید، با پزشک خود در خصوص آن مشورت نمایید.
- پس از چهار هفته مصرف دارو، اثرات ضد افسردگی آن مشخص می‌شود. بدون دستور پزشک مصرف دارو را قطع نکنید.
- در طول مصرف داروهای مهارکننده متوآمین اکسیداز تا ۱۴ روز پس از قطع این داروها از مصرف سینتالوپرام خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

- مصرف این دارو در موارد زیر به جز در شرایط ویژه ممنوع است:
- حساسیت به سینتالوپرام و یا هریک از موارد جانبی
- در موارد زیر بایستی نسبت اثرات مفید دارو به عوارض آن در نظر گرفته شود:

- بیماری‌های قلبی
- سابقه سکته قلبی
- اختلال عملکرد کبدی

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی ممنوع است مگر به تجویز پزشک.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو توسط پزشک تعیین می‌شود ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

■ بزرگسالان:

ضد افسردگی: شروع دوز با ۲۰ میلی‌گرم روزانه در یک دوز واحد، صبح یا عصر (همراه غذا یا با معده خالی).
مقدار دارو می‌تواند به میزان ۲۰ میلی‌گرم یکبار در روز در فواصل زمانی حداقل یک هفته افزایش یابد. معمولاً دوز مصرفی به ۴۰ میلی‌گرم افزایش می‌یابد، البته تعدادی از بیماران به دوز مصرفی ۶۰ میلی‌گرم در روز نیاز دارند (مطالعات نشان داده است که مصرف ۶۰ میلی‌گرم در روز مزیتی نسبت به ۴۰ میلی‌گرم در روز ندارد. بنابراین دوز ۶۰ میلی‌گرم در روز به طور معمول پیشنهاد نمی‌شود).

دوز مصرفی در بیماران با اختلال عملکرد کبدی ۲۰ میلی‌گرم در روز توصیه می‌شود.

حداکثر دوز مصرف در بزرگسالان: ۶۰ میلی‌گرم در روز.

■ افراد مسن:

ضد افسردگی: ۲۰ میلی‌گرم روزانه در یک دوز واحد، صبح یا عصر، مقدار دوز مصرفی می‌تواند تا ۴۰ میلی‌گرم در روز افزایش یابد.

تعدادی از بیماران مسن به دوز مصرفی ۱۰ میلی‌گرم در روز پاسخ می‌دهند.

حداکثر دوز مصرفی در افراد مسن: ۴۰ میلی‌گرم در روز

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا،
خیابان ولیعصر، رویروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۰۲۱-۴۴ ۵۳ ۶۰ ۲۰-۲۴؛ نمابر: ۰۲۱-۴۴ ۵۳ ۵۰