قرص ال دورام – سی® و ال دورام – سی فورت®

قرص لوودوپا - کربی دوپا ۱۰/۱۰۰ میلی‌گرم - قرص لوودوپا - کربی دوپا ۲۵/۱۰۰ میلی‌گرم
قرص لوودوپا - کربی دوپا ۲۵/۲۵۰ میلی‌گرم

راهنمایی‌های عمومی جهت مصرف دارو:
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- وجود هر نوع حساسیت به لوودوپا و کربی دوپا و یا هر یک از اجزای این دارو، مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد نگهدارنده و رنگ ها.
- در صورت ابتلا به بیماری‌هایی نظیر بیماری‌های حاد قلبی - عروقی، گلوکوم، ملانوما، اختلال روانی، سابقه سکته قلبی، زخم‌های گوارشی، سایکوز، بیماری حاد ریوی، اختلال عملکرد کلیوی، زخم های پوستی، احتباس ادراری.
- در صورت بارداری و شیردهی.
- درصورت مصرف سایر داروها خصوصا هالوپریدول، مهارکننده‌های MAO ، فنوتیازین ها، سلژیلین، تیوکزانتین‌ها و مواد غذایی با پروتئین بالا.
- در افراد مسن.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:
- دوره درمان را کامل کنید. دارو را فقط طبق دستور پزشک مصرف نمایید.
- مصرف دارو را بدون نظر پزشک قطع نکنید.
- بعد از شروع درمان، ظهور حداکثر اثر دارو ممکن است تا چند هفته یا ماه اتفاق نیافتد.
- درصورت فراموشی یک دوز به محض یادآوری آن را مصرف نمایید، در صورتی که به زمان دوز بعدی کمتر از ۲ ساعت باقی‌مانده، از مصرف آن صرف نظر نمایید و از دو برابر کردن دوزها خودداری نمایید.
- در صورت نیاز به هرگونه اعمال جراحی (شامل جراحی های دندان) پزشک خود را مطلع سازید.
- این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی گردد، بنابراین احتیاط نمایید.
- هنگام برخاستن از حالت نشسته و یا خوابیده احتیاط نمایید.
- بعد از بهبود وضعیت، برای از سرگرفتن فعالیت‌های فیزیکی احتیاط نمایید. (به خصوص در افراد مسن)

موارد منع مصرف:
- مصرف این دارو در موارد زیر به جز در شرایط ویژه ممنوع است:
گلوکوم با زاویه‌ی بسته، حساسیت به لوودوپا، کربی دوپا و یا هر یک از اجزای فرآورده، ملانوما یا سابقه آن، زخم‌های پوستی مشکوک.
- در موارد زیر پایستی نسبت اثرات مفید به عوارض دارو در نظر گرفته شود:
آسم و مشکلات ریوی، بیماری‌های حاد قلبی، وجود زمینه ابتلا به گلوکوم با زاویه بسته، سابقه سکته قلبی، سندرم نورولپتیک بدخیم (neuroleptic malignant syndrome)، زخم‌های گوارشی، اختلال عملکرد کلیوی.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:
- مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود.

مقدار و نحوه‌ی مصرف دارو:
مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:
بزرگسالان:
بیمارانی که قبلا تحت درمان با لوودوپا نبوده اند:
- مقدار مصرف بهتر است با یک قرص ال دورام سی® ۱۰/۱۰۰ سه تا چهار بار در روز یا یک قرص ال دورام سی® ۲۵/۱۰۰ سه بار در روز شروع شود.
مقدار مصرف ممکن است هر روز یا یک روز درمیان، در صورت لزوم و تحمل بیمار، افزایش یابد.
بیمارانی که قبلا تحت درمان با لوودوپا بوده اند:
- مصرف لوودوپا باید حداقل ۱۲ ساعت قبل از مصرف این دارو قطع گردد، دوز روزانه این دارو باید طوری انتخاب شود که تقریبا ۲۵٪ از دوز قبلی لوودوپا را تامین کند.
بیمارانی که کمتر از ۱۵۰ میلی‌گرم لوودوپا در روز مصرف می‌کنند باید با یک قرص ال دورام سی® ۱۰/۱۰۰ یا یک قرص ال دورام سی® ۲۵/۱۰۰ سه یا چهار بار در روز شروع کنند.
دوز شروع پیشنهادی برای بیمارانی که بیش از ۱۵۰ میلی‌گرم لوودوپا در روز مصرف می‌کنند، یک قرص ال-دورام سی فورت® ۲۵/۲۵۰ سه یا چهار بار در روز است.
- حداکثر میزان مصرف روزانه از این دارو ۲۰۰ میلی‌گرم کربی دوپا و ۲ گرم لوودوپا می‌باشد.
- در صورت نیاز و تحمل بیمار لوودوپا به تنهایی نیز می‌تواند به رژیم درمانی اضافه شود.
- دارو را برای چندماه اول که تحمل به اثرات گوارشی آن ایجاد شود، بعد از غذا مصرف نمایید. سپس برای بیشترین میزان جذب دارو آن را با معده خالی مصرف نمایید.
کودکان:
- ایمنی و اثربخشی این دارو در کودکان اثبات نشده است. لذا استفاده از دارو در بیماران زیر ۱۸ سال توصیه نمی‌شود.

تداخلات دارویی:
- در صورت تجویز داروهای زیر همزمان با لوودوپا - کربی دوپا باید احتیاط کرد.
داروهای بیهوشی، هالوپریدول، فنوتیازین‌ها، ریسپریدون، تیوکزانتین‌ها، مهار کننده های MAO ، سلژیلین.

عوارض جانبی:
هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت مشاهده هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.
عوارض که در صورت بروز نیاز به مراقبت های پزشکی دارند:
عوارض شایع: بی‌قراری، اضطراب، اختلال حرکتی، دندان قروچه، گیجی، هذیان، سرگیجه، اختلال در بلع، افوریا، خستگی، احساس ضعف، توهم، افزایش لرزش دست، تهوع و استفراغ، نوروپاتی محیطی، زیاد شدن بزاق، ناتوانی.
عوارض با شیوع کمتر: اسپاسم پلکها، تاری دید، اختلالات قلبی، گر گرفتگی، اتساع مردمک، اختلالات حسی، افت فشارخون وضعیتی، تپش قلب، راش پوستی، فشردگی عضلات فک، افزایش یا کاهش غیر طبیعی وزن، بی‌اختیاری ادرار، احتباس ادراری.
عوارض نادر: آگرانولوسیتوزیس، زخم دوازدهه، ادم، خونریزی گوارشی، انمی همولیتیک، افزایش فشارخون، اشکال در حرکت چشم، فلبیت، اختلال نعوظ، تشنج.
عوارض که در صورت تداوم و یا آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:
عوارض شایع: درد شکم، بی‌اشتهایی، خشکی دهان، نفخ، کابوس شبانه.
عوارض با شیوع کمتر: یبوست، اسهال، سرخی پوست، سردرد، سکسکه، افزایش بزاق، بی‌خوابی، انقباض ناگهانی عضلات، خستگی غیرعادی.
عوارض که نیاز به مراقبت پزشکی ندارند:
عوارض با شیوع کمتر: احساس مزه تلخ، احساس سوزش زبان، تیره شدن رنگ ادرار، بزاق و عرق.

عوارض مصرف بیش از حد دارو:
- بلفارواسپاسم (افزایش اسپاسم پلک‌ها) معمولا سریع‌ترین عارضه ای است که در مصرف بیش از حد دارو مشاهده می‌شود.

مسمومیت:
- درصورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، بیمار را سریعا به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:
- دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

بسته بندی:
- قرص ال دورام سی® ۱۰/۱۰۰، ال دورام سی® ۲۵/۱۰۰ و ال دورام سی فورت® ۲۵/۲۵۰ به صورت ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی در یک جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

L-T116-02

Reference:
1)USPDI 2007 ,27" Edition, Vol 1, Drug information for health care professional, page: 712-719

ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

تهران، کیلومتر۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا، خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۲۰ ۶۰ ۵۳ ۴۴ ۰۲۱ نمابر: ۵۰ ۳۵ ۵۰ ۴۴ ۰۲۱

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsuos Road, Tehran 13 98 83 41 11 - IRAN www.ramopharmin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50