



آزارام® ۲۵ و ۵۰

آرتانوپیرین

۱۲۰ میلی‌گرم به ازای هر متر مربع سطح بدن در روز پیوند ۳ - ۱ روز قبل از عمل پیوند مصرف می‌شود.

دوز نگهدارنده: ۳ - ۱ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یا ۴۵ میلی‌گرم به ازای هر متر مربع سطح بدن در روز مصرف می‌شود.

● آرتانوپیرین روماتوئید، بیماری‌های التهابی روده، سیروز صفراوی، درماتومیوزیت، گلوکوماتوئیت، هیپاتیت مزمن فعال، لوپوس اریتماتوز، میوپاتی، میاستنی گراویس، سندروم نفروتیک، پمفیگوس.

دوز شروع: ۱ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز، مقدار دوز مصرفی می‌تواند ۵/۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز پس از ۶ تا ۸ هفته و سپس برحسب نیاز هر ۴ هفته اضافه شود تا حداکثر به دوز ۲/۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز برسد. **دوز نگهدارنده:** مقدار دوز مصرفی تا حداقل دوز موثر به میزان ۵/۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ۴ هفته کاهش داده شود. در کودکان: به دوز مصرفی در بزرگسالان و نوجوانان مراجعه شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز هر عارضه‌ای با پزشک مشورت شود.

به محض بروز عوارض زیر با پزشک تماس بگیرید:

عوارض شایع: لوکوپنی یا عفونت تب و لرز، سرخه، درد پشت یا پهلو، اشکال در دفع ادرار یا ادرار دردناک، کم خونی مگالوبلاستیک (احساس خستگی یا ضعف).

عوارض یا شایع کمتر: (وابسته به دوز)

مشکل کبدی یا صفراوی، ترومبوسیتوپنی، خونریزی غیرعادی، مدفوع خونی در ادرار و مدفوع، نقاط قرمز رنگ روی پوست.

عوارض نادر: حساسیت مفه‌ای - روده‌ای (تھوع شدید، استفراغ یا اسهال، تب، درد مفاصل، احساس ناراحتی و بیماری)، بیماری کبدی (درد شکم، برجستگی‌ها)، حساسیت (ضربان قلب، تب، درد ماهیچه‌ای یا مفاصل، قرمزی پوست)، پانکراتیت (درد شکم شدید همراه با تهوع و استفراغ)، پتئومونی (سرخه، مشکل در تنفس)، درد در دهان یا در لب‌ها.

در صورت ادامه عوارض زیر با پزشک تماس بگیرید.

عوارض شایع: کاهش اشتها، تهوع و استفراغ.

عوارض یا شایع کمتر: بثورات پوستی.

در صورت بروز عوارض زیر پس از قطع دارو با پزشک تماس بگیرید:

تحلیل مغز استخوان (مدفوع تیره، خون در ادرار، سرخه، تب، لرز، درد پشت یا پهلوها، اشکال در دفع ادرار یا ادرار دردناک، نقاط قرمز روی پوست، خونریزی غیرعادی).

عوارض مصرف بیش از حد دارو:

خونریزی (نقاط قرمز روی پوست، خونریزی غیرعادی)، اسهال، لوکوپنی یا عفونت تب و لرز، درد پشت یا پهلوها، ادرار دردناک یا مشکل در دفع ادرار)، سمیت کبدی، تهوع و استفراغ.

● در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر تعیین شده بیمار را هرچه سریعتر به بیمارستان مسمومین منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

● دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.

● دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

● از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

بسته بندی:

● قرص آزارام ۲۵ و ۵۰ میلی‌گرم، به صورت ۵ پیوست ۲۰ عددی در یک جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- وجود هر نوع حساسیت به آرتانوپیرین و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ، رنگها و غیره.
- در صورت بارداری و شیردهی.
- در صورت مراجعه به دندانپزشک.
- در صورت واکسیناسیون.
- در صورت ابتلا به بیماری‌هایی نظیر آلبره مرغان، زونا (هرپس زوستر)، نفرس، بیماری‌های عفونی، بیماری‌های کلیوی و کبدی، بیماری غدد پانکراس و کمبود گزانتین اکسیداز.
- به منظور جلوگیری از ناسازگاری دارویی در مورد هر نوع دارو چه با نسخه یا بدون نسخه با پزشک خود مشورت کنید.
- در صورت مصرف داروهای نظیر آلوپورینسول، وارفارین، کلرامبوسیل، گورتیکواستروئیدها، سیکلوفسفامید، سیکلوسپورین و مرکاپتوپورین.

نحوه مصرف:

- دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید و مقدار مصرف را بیشتر یا کمتر نکنید در صورت مصرف داروهای دیگر، اطمینان حاصل گردد که هر دارو در زمان تعیین شده مصرف شود.
- مصرف دارو را بدون مشورت پزشک قطع نکنید.
- گاهی اوقات این دارو باعث تهوع و استفراغ می‌شود. مصرف این دارو پس از غذا و یا در موقع خواب باعث کاهش این عارضه می‌گردد.
- اگر کمی پس از مصرف قرص‌های آزارام استفراغ نمودید با پزشک تماس بگیرید. زیرا ممکن است لازم باشد مجدداً دارو را مصرف نمایید. در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید و برنامه مصرف داروی شما یک نوبت در روز است نوبت فراموش شده را حذف کرده و نوبت بعدی را نیز دوباربر نکنید و به برنامه مصرف قبلی خود بازگردید.

اما در صورتی که چند بار در روز این دارو را مصرف می‌نمایید به محض به یاد آوردن نوبت فراموش شده آن را مصرف نموده و در صورتی که نوبت مصرف بعدی فرا رسیده آن را دو برابر کنید و سپس به برنامه قبلی خود بازگردید. اما در صورتی که چند نوبت از دارو را فراموش کردید با پزشک تماس بگیرید.

- در طول درمان جهت پیگیری مرتب با پزشک معالج تماس بگیرید.
- در طول مصرف این دارو و پس از آن با انجام مگالوبلاستوسین خودداری نموده مگر به تجویز پزشک و از تماس با افرادی که از واکسن فلج استفاده کرده‌اند جداً اجتناب کنید.
- از تماس با افرادی که دچار بیماری عفونی (باکتری و ویروس) شده‌اند خودداری نمایید.

● در صورت بروز هرگونه خونریزی غیرعادی، مدفوع سیاه رنگ، وجود خون در ادرار و نقاط قرمز رنگ بر روی پوست و در صورت بروز علائم مثل تب احساس سرما، سرخه، درد پشت و یا دفع ادرار دردناک با پزشک تماس بگیرید.

● در صورت مراجعه به دندانپزشک، هنگام مسواک زدن و استفاده از نخ دندان مراقبت‌های لازم صورت بگیرید.

● با توجه به اینکه مصرف این دارو مقاومت بدن را در برابر بیماری‌های عفونی کاهش می‌دهد، لازم است با رعایت اصول بهداشتی از ایجاد هرگونه عفونت، زخم یا بریدگی در بدن جلوگیری نمایید. همچنین بهداشت کامل دهان و دندان را رعایت نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی غیرمجاز است مگر در موارد اضطراری و به تشخیص پزشک متخصص.

مقدار مصرف در بزرگسالان و نوجوانان:

- پیشگیری از دفع عضو پیوندی:
- دوز شروع: ابتدا مقدار ۵ - ۳۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یا



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsoos
Road, Tehran 1398834111 - IRAN www.ramopharmin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی میتا،
خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۴۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۲۰ ۴۴ ۵۳ ۴۴ - ۲۱ - ۲۴ ۵۰ ۳۵ ۵۰ - ۲۱ - ۴۴ ۵۰ ۳۵ ۵۰