قرص کاربارام© ۲۰۰

کاربامازپین

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- وجود هر نوع حساسیت به کاربامازپین و ضد افسردگی‌های سه‌حلقه ای
- در صورت بارداری و شیردهی.
- در صورت نیاز به عمل جراحی و یا دندانپزشکی.
- استفاده در کودکان و افراد مسن.
- وجود اختلالات دو قطبی.
- درصورت مصرف داروهایی از قبیل سایمتیدین، ضد انعقادها، دیلتیازم، ایریترومایسین، کورتیکواستروئیدها، پروپوکسی فن، وراپامیل، کینیدین، ضد بارداری‌های خوراکی، ایزونیازید، ایتراکونازول، مهارکننده‌های مونو آمین اکسیداز، ضد تشنج‌های دیگر، ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای، پریمیدون، باربیتورات ها، بنزودیازپین‌ها، والپروئیک اسید، کلاریترومایسین، کلومیپرامین، الکل، دلاویردین، فلباماٹ، فلووکسامین، استروژن‌ها، کتوکونازول، لاموتریژین و ریسپریدون.
- درصورت ابتلا به بیماریهایی نظیر صرع، مشکلات قلبی و خونی، ساپرشن مغز استخوان.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه کنید:

- دارو دقیقا مطابق با دستور پزشک مصرف گردد.
- در طول درمان جهت پیگیری مرتب با پزشک معالج تماس بگیرید.
- دارو را برای دردهای کم استفاده نکنید.
- در صورت استفاده از هر داروی با نسخه یا بدون نسخه و یا داروهای گیاهی پزشک خود را مطلع سازید.
- از مصرف الکل و داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی خودداری کنید.
- در صورت بروز علایم زیر فورا به پزشک اطلاع دهید: تب، گلودرد، راش، زخم دهانی، کبود شدن و مشکلات خونریزی.
- جهت جلوگیری از بارداری از روشی متفاوت از ضد بارداری‌های خوراکی حاوی استروژن استفاده کنید.
- مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی، گیجی و تاری دید گردد، لذا ضمن درمان با این دارو از انجام رانندگی و کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری شود.
- به دلیل امکان ایجاد عارضه حساسیت پوستی از قرار گرفتن در معرض نور خورشید بدون استفاده از ضد آفتاب و پوشش مناسب خودداری گردد.
- در صورتی که یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض یادآوری مصرف نمایید. در صورتی که مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد آن را مصرف نموده، دوز بعدی را دو برابر نکنید. اگر بیش از یک دوز در روز فراموش گردید با پزشک خود تماس بگیرید.
- به منظور کاهش عوارض گوارشی، دارو بعد از غذا میل گردد.
- از مصرف میوه گریپ فروت و یا آب آن با دارو خودداری گردد.

موارد منع مصرف:

مصرف این دارو در موارد زیر به جز در شرایط ویژه ممنوع است:

- برخی از انواع صرع، بلوک قلبی، اختلالات خونی که باعث مشکلات جدی در پلاکت، آهن خون و ... شود، ساپرشن مغز استخوان، حساسیت به ضد افسردگی‌های سه حلقه ای.

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف در دوران بارداری و شیردهی ممنوع است، مگر به تجویز پزشک متخصص.

مقدار و نحوه مصرف صحیح دارو:

- بزرگسالان و کودکان بالاتر از ۱۲ سال

مقدار شروع دارو ۲۰۰ میلی‌گرم، دو بار در روز است و در صورت نیاز مقدار دوز مصرفی در فواصل هفتگی تا حصول بهترین نتیجه درمانی تا ۲۰۰ میلی‌گرم در روز می‌تواند افزایش یابد.

دوز نگهداردنه: مطابق با حداقل مقدار ماده موثر معمولا ۶۰۰ میلی‌گرم تا ۱/۶ گرم در روز می‌باشد.

به عنوان ضد درد عصبی: شروع درمان ۱۰۰ میلی‌گرم، ۲ بار در روز می‌باشد که دوز دارو تا ۲۰۰ میلی‌گرم در روز می‌تواند افزایش یابد. درصورت نیاز تا زمان بهبود درد ۱۰۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت افزایش می‌یابد.

دوز نگهداردنه: ۲۰۰-۱۲۰۰ میلی‌گرم در روز در ۲ دوز منقسم.

دوز مصرف در بیماران ۱۲ - ۱۵ سال حداکثر ۱ گرم و در بیماران بزرگتر از ۱۵ سال حداکثر ۱/۲ گرم در روز می‌باشد.

اطفال ۶-۱۲ سال

به عنوان ضد تشنج: مقدار شروع ۱۰۰ میلی‌گرم، دو بار در روز است و درصورت نیاز و تحمل بیمار مقدار دوز مصرفی در فواصل هفتگی تا حصول بهترین نتیجه درمانی تا ۱۰۰ میلی‌گرم در روز می‌تواند افزایش یابد.

دوز نگهداردنه: مطابق با حداقل دوز موثر ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.

اطفال کمتر از ۶ سال

به عنوان ضد تشنج: شروع دارو با ۱۰ - ۲۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ۲ تا ۳ دوز منقسم می‌باشد و مقدار دوز مصرفی در فواصل هفتگی تا ۱۰۰ میلی‌گرم در روز، در صورت نیاز و تحمل بیمار می‌تواند افزایش یابد.

دوز نگهداردنه: مطابق با حداقل دوز موثر به طور معمول ۳۵۰ - ۴۵۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد و معمولا بیش از ۴۰ میلی‌گرم و یا ۳۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز نمی‌شود.

عوارض جانبی:

- هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، درصورت مشاهده هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.
- **عوارضی که در صورت بروز نیاز به مراقبت پزشکی دارند:**

عوارض شایع: سمیت سیستم عصبی شامل تاری دید، دوبینی و نیستاگموس.

عوارض با شیوع کمتر: واکنش‌های آلرژیک، استیونس - جانسون (راش پوستی و خارش)، اضطراب، عدم هماهنگی در کنترل ماهیچه ها و عدم کنترل حرکت، تغییرات خلقی، درد قفسه سینه، افسردگی، اسهال، اشکال در صحبت کردن، هایپوناترمیا، عفونت، واکنشهای مانیک، اقدام به خودکشی و سندرم شبه لوپوس اریتماتوز.

- **عوارضی که در صورت تداوم یا آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:**

عوارض شایع: سردرد ملایم، تهوع، استفراغ، گیجی و خواب آلودگی.

عوارض با شیوع کمتر و نادر: کرامپ عضلانی، طاسی، فراموشی، بی‌اشتهایی، آستنیا، درد پشت، یبوست، افزایش تعریق، اسهال، خشکی دهان، سو. هاضمه، خارش، مشکلات جنسی، خواب‌آلودگی، اختلال درصحبت کردن و درد شکمی، استوماتیت، سردرد، افزایش حساسیت به نور، درد معده، خستگی غیرعادی.

مسمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر تعیین شده بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

- قرص‌های کاربارام© ۲۰۰ به صورت ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی در یک جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

L-T21122-02
Reference: USP DI 2007, Vol 1, pages: 703-711

ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا، خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۰۲۰ ۴۴۵۳۶۰ ۲۱ - ۰۲۱ نمابر: ۵۰ ۳۵ ۴۴ ۵۰ ۲۱ - ۰۲۱

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsuos Road, Tehran 13 98 83 41 11 - IRAN www.ramopharmin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50