



گترام[®] ۱ میلی‌گرم کتوتیفن

به یاد آوردن، آن نوبت را مصرف نمایید ولی چنانچه زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده باشد از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هردارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

■ در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک خود مشورت نمایید:

عوارض با شیوع کمتر: علانم شبه آنفولانزا و عفونت دستگاه تنفسی.

در صورت ادامه یا مزاحمت عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

عوارض شایع: افزایش وزن.

عوارض با شیوع کمتر یا نادر: درد شکمی، تحریک سیستم اعصاب مرکزی (هیجان، تحریک پذیری، بیخوابی و عصبی شدن)، گیجی، خشکی دهان، خونریزی غیرعادی از بینی، افزایش اشتها، خواب آلودگی، راش پوستی، تورم پلکها و اختلال خواب.

توجه: در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده و بروز علائمی از قبیل گیجی، عدم هوشیاری، تشنج، کاهش فشارخون و افزایش ضربان قلب، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

■ دارو در دور از نور، رطوبت (قرص) و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ زدگی (شریت) محافظت شود.

■ دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

■ از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

بسته بندی:

■ قرص روکش دار ۱ میلی‌گرم گترام در جعبه‌های ۱۰۰ عددی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

■ شریت خوراکی گترام (۵ میلی‌لیتر حاوی ۱۲۰ میلی‌گرم کتوتیفن می‌باشد) در شیشه قهوه‌ای رنگ ۱۲۰ میلی‌لیتری در درب پیلوفرپروف در یک جعبه مقوایی به همراه پیمانه و برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی‌های عمومی جهت مصرف دارو:

■ مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی گردد، لذا ضمن درمان به ویژه در مراحل اولیه از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

■ به منظور کنترل پیشرفت درمان به طور منظم با پزشک خود در تماس باشید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

■ وجود هرگونه حساسیت به کتوتیفن و یا به هر یک از مواد تشکیل دهنده دارو.

■ در صورت مصرف سایر داروها به ویژه داروهای ضد دیابت خوراکی، آنتی هیستامین‌ها، خواب آورها، آرامبخش‌ها و الکل.

در صورت داشتن بیماری به ویژه بیماری‌هایی از قبیل دیابت ملیتوس و صرع.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در انسان برای مصرف در دوران بارداری انجام نشده است.

این دارو در شیر حیوانات ترشح می‌شود و ممکن است در شیر انسان نیز ترشح شود بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی برای مادران شیرده توصیه نمی‌شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، مقدار مصرف این دارو به طور معمول به قرار زیر است:

بزرگسالان: ۱ میلی‌گرم دو بار در روز صبح و عصر (معادل ۱ قرص و یا یک پیمانه ۵ میلی‌لیتری شریت)

کودکان بالای سه سال: ۱ میلی‌گرم دو بار در روز صبح و عصر (معادل یک پیمانه ۵ میلی‌لیتری شریت)

کودکان ۶ ماه تا سه سال: ۰/۵ - ۱ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دو بار در روز صبح و عصر.

■ دارو را می‌توان همراه غذا و یا بدون آن مصرف کرد. در صورت فراموش کردن مصرف یک دوز، به محض



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران