



استامینوفن ۵۰۰ میلی‌گرم قرص

حداکثر دوز در بزرگسالان: تا ۴ گرم روزانه.

■ **کودکان**
ضد درد و ضد تب: ۱/۵ گرم به ازای هر مترمربع از سطح بدن در روز در دوزهای منقسم.

تداخلات دارویی:

■ الککل، القا، کننده‌های آنزیم‌های کبدی یا داروهای هپاتوتوکسیک، ضد انعقادها، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، آسپرین یا دیگر سالیسیلات‌ها.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید.

■ **عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:**

■ **عوارض نادر:** آگرانولوسیتوزیس، اتمی، درمانیت، آلرژی، التهاب کبد، مشکلات کلیوی، کاهش مقدار ادرار، عفونت ادراری، ترومبوسیتونی.

مسمومیت:

■ در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را سریعاً به مراکز درمانی درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

■ دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.
■ دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

■ قرص استامینوفن ۵۰۰ میلی‌گرم به صورت ۳ و ۱۰ پلیستر ۱ عددی در جعبه مقوایی ۳ و ۱۰ عددی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

راهنمای های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

■ این دارو برای بیماری‌های فعالی شما گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه‌ای آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

■ حساسیت به استامینوفن یا آسپرین.
■ استفاده در کودکان.
■ بیماری‌ها خصوصاً الکلیسم، هپاتیت ویروسی، مشکلات کبدی.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

■ دارو را بیش از مقدار توصیه شده مصرف ننمایید، زیرا استامینوفن در استفاده طولانی مدت و یا بیش از حد، می‌تواند سبب آسیب کبدی یا کلیوی شود.

■ به جز در صورت تجویز پزشک، کودکان مجاز به دریافت بیش از ۵ دوز در روز نمی‌باشند.

■ در صورت مصرف سایر داروهای حاوی استامینوفن همزمان با این دارو خطر مسمومیت وجود دارد.

■ در صورت مصرف بیش از ۱-۲ دوز از این دارو از مصرف الککل خودداری نمایید، زیرا در این صورت خطر سمیت کبدی افزایش می‌یابد. در صورت مصرف بیش از حد، حتی در صورت عدم وجود علائم، بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید. علائم مسمومیت ممکن است با تأخیر ظاهر شود اما درمان باید در اولین فرصت انجام شود. درمان مسمومیت بعد از ۲۴ ساعت یا بیشتر ممکن است در پیشگیری از آسیب کبدی و مرگ و میر بی‌تاثیر باشد.

موارد منع مصرف:

■ در موارد زیر نسبت اثرات مفید دارو به عوارض آن باید در نظر گرفته شود:
■ الکلیسم، بیماری‌های کبدی، هپاتیت ویروسی.

مصرف در بارداری و شیردهی:

■ مشکلاتی با مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی گزارش نشده است. اگرچه به دلیل عبور استامینوفن از جفت و ترشح آن در شیر بهتر است که مصرف آن با نظر پزشک صورت گیرد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

■ **بزرگسالان**
ضد درد و ضد تب: ۳۲۵ - ۵۰۰ میلی‌گرم خوراکی هر ۳ ساعت، ۳۲۵ - ۶۵۰ میلی‌گرم هر ۴ ساعت، ۶۵۰ میلی‌گرم تا ۱ گرم هر ۶ ساعت در صورت نیاز یا ۱۳۰۰ میلی‌گرم هر ۸ ساعت، هنگامی که علائم ظاهر شوند.



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsoos Road, Tehran 13 98 83 41 11 - IRAN www.ramopharmin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا،
خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۲۰ - ۶۰ ۵۳ ۴۴ - ۰۲۱ - ۵۰ ۳۵ ۴۴ - ۰۲۱