



دیکلورامین® ۲۵ قرص انتریک کتود دیکلوفناک سدیم ۲۵ میلی‌گرم

آرتريت روماتوئيد: ۵۰ ميلي‌گرم سه يا چهار بار در روز و يا ۷۵ ميلي‌گرم دو بار در روز.

روماتيسم ستون فقرات: ۲۵ ميلي‌گرم چهار بار در روز و امکان اضافه کردن ۲۵ ميلي‌گرم ديگر هنگام خواب در صورت نياز.

کودکان:

- کارايي و ايميمني اين دارو در کودکان به اثبات نرسيده است.
- دارو را با يك ليوان پر از آب ميل نماييد.
- دارو را به طور کامل بلعيده و از خرد کردن، جوييدن و يا باز کردن آن خودداری نماييد.

تداخلات دارويي:

- مهارکننده‌های ACE (مانند کاپتوپريل، انالپريل، ليزينوپريل و ...)، استامينوفن، الكل، مکمل‌های حاوی پتاسيم، کورتیکواستروئيدها، گلوکوکورتیکوئيد های خوراکی، داروهای ضد انعقاد مانند هپارين، ديگوکسين، داروهای ترومبوليتيک ماننداسترپتوکيناز، وارفارين، داروهای ضد ديابت، انسولين، داروهای ضد فشارخون، داروهای مدر مانند تريامترن، آسپرين، والپروئیک اسيد، کولشي سين، سيکلوسپورين، ليتيم، متوترکوسات، پروسنيد، ايندومتاسين و ساير داروهای ضد التهاب غيراستروئيدی.

عوارض جانبی:

- هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه اين عوارض در يك فرد ديده نمیشود، در صورت بروز هر يك از عوارض زیر با پزشک مشورت نماييد.
- عوارضی که در صورت بروز نیاز به مراقبت پزشکی دارند:
- عوارض با شيوع بيشتر: مشکلات کليوی
- عوارض با شيوع کمتر: اثرات قلبی، خارش، راش پوستی، تورم شکمی، زنگ زدن گوش‌ها.

عوارضی که در صورت تداوم يا آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

- عوارض با شيوع بيشتر: سردرد، عوارض گوارشی، يبوست، اسهال، سو، جب، تهوع.
- عوارض با شيوع کمتر: گيجی، نفخ.
- عوارضی که در صورت بروز نیاز به قطع مصرف دارو و مراجعه به پزشک دارند:
- خونريزی گوارشی، شوک آنافیلاکسی، آنژیوادم، برنوکواسپاسم.

مسموميت:

- در صورت مصرف اتفاقی بيش از مقادير توصيه شده، بیمار را سريعاً به مراکز درمانی منتقل نماييد.

شرایط نگهداری:

- دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته‌بندی:

- قرص دیکلورامین ۲۵ ميلي‌گرم بصورت ۱۰ بسته ۱۰ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

L-T154-01

References:

- 1- USPDI 2007, 27th Edition, Vol11, Drug information for health care professional, page: 379-392
- 2- Drug Facts And Comparisons 2015, Vol12, page:1427-1470



ساخت شرکت داروسازی راموفارمین
تهران - ایران

راهنمای‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه‌ی آن به دیگران خودداری نمائید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- وجود هرگونه حساسیت به دیکلوفناک سدیم یا ساير داروهای مشابه، اجزای تشکیل دهنده این دارو، مواد دیگر از قبیل رنگ‌ها، غذاها و مواد نگهدارنده.
- ابتلا به بیماری‌های قلبی، کبدی، کلیوی، اختلالات و خونريزی‌های گوارشی، دیسکرازی خونی و سايرش منفر استخوان.
- در صورت نیاز به جراحی، پزشکی یا دندانپزشک خود را از مصرف دارو مطلع نماييد.
- بارداری و شیردهی
- افراد مسن

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه کنید:

- دارو را ۲۰ دقیقه قبل از غذا و ۲۰ دقیقه بعد از غذا مصرف کنید.
- جهت درمان آرتريت دوره مصرف دارو را کامل کنید زیرا ظهور اثر دارو از چند روز تا بیش از ۲ هفته (در موارد شدید) زمان نیاز دارد.
- چنانچه دارو را ۱-۲ نوبت در روز مصرف می‌کنید در صورت فراموشی يك نوبت از دارو، اگر ۱-۲ ساعت بعد به یاد آوردید فوراً دارو را مصرف نماييد در غير اينصورت از مصرف آن صرف نظر کنید.
- چنانچه دارو را بیش از ۲ نوبت در روز مصرف می‌کنید در صورت فراموشی يك نوبت از دارو، به محض یادآوری آن را مصرف نماييد مگر اينکه زمان مصرف دوز بعدی رسيده باشد، در اينصورت مقدار مصرف دارو را برابر نکند.

موارد منع مصرف:

- حساسیت شدید به دارو یا هریک از اجزای به کار رفته در آن.
- درمان دردهای عمل جراحی پای پس عروقی گروتن.
- ابتلا به بیماری‌ها و مشکلات زمینه‌ای نظیر دیسکرازی خونی، پورفیریای کبدی، سايرش منفر استخوان.
- بیماران با محدودیت مصرف سدیم.
- بیمارانی که به دنبال مصرف آسپرين و ساير داروهای ضد التهاب غيراستروئيدی علایمی مانند آسم، رينيت، کهير، پليپ بینی، آنژیوادم، برنوکواسپاسم و ديگر نشانه‌های واکنش‌های آلرژي و آنافیلاکتیک را تجربه کردند.

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو همانند ساير داروهای ضدالتهاب غيراستروئيدی در سه ماهه دوم و سوم بارداری توصيه نمی‌شود. همچنین بدلیل ترشح این دارو در شیر مادر، مصرف آن در دوران شیردهی توصيه نمی‌شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- بعد از مشاهده پاسخ به درمان اولیه با این دارو، دوز دارو و تناوب مصرف آن با توجه به ویژگی‌های فردی بیمار توسط پزشک تعیین می‌گردد.
- مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

بزرگسالان:

استاندارد تريت: ۵۰ ميلي‌گرم دو يا سه بار در روز و يا ۷۵ ميلي‌گرم دو بار در روز.