



قرص ویتامین ب ۶ ۴۰ میلی گرم
(پیریدوکسین هیدروکلراید)

■ **کودکان:**

کمبود ویتامین ب ۶: ۵-۲ میلی گرم به مدت سه هفته
سپس ۵-۲ میلی گرم در فرآورده های مولتی ویتامین.

■ **تداخلات دارویی:**

■ لوودوپا، فنی تونین.

■ **عوارض جانبی:**

■ هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود:
نوروپاتی حسی (sensory neuropathic)، اختلال در راه رفتن، کرختی پاها، کاهش حساسیت به لمس، دما و لرزش، واکنش های حساسیت نوری، سردرد.

■ **مسمومیت:**

■ در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر تعیین شده بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

■ **شرایط نگهداری:**

■ فرآورده دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.
■ فرآورده دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

■ **بسته بندی:**

■ قرص ویتامین ب ۶ به صورت ۱۰ پلیستر ۱۰ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای فرآورده بسته بندی می گردد.

L-T156-02

References:

1) BNF 2015, page: 689

2) Drug Facts And Comparisons 2015, Vol 1, pages:19-25

3) www.uptodate.com

■ **راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح فرآورده:**

■ این فرآورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری نمی باشد.

■ **قبل از مصرف این فرآورده، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:**

■ در بیمارانی که داروی لوودوپا و فنی تونین استفاده می کنند.
■ بارداری و شیردهی.
■ استفاده در کودکان.

■ **هنگام مصرف فرآورده به نکات زیر توجه کنید:**

■ مصرف بیش از ۲۰۰ میلی گرم در روز ممکن است سبب وابستگی گردد.

■ **موارد منع مصرف:**

■ حساسیت به پیریدوکسین و یا هر یک از اجزای فرمولاسیون

■ **مصرف در بارداری و شیردهی:**

■ توصیه می شود ویتامین ب ۶ در بارداری و شیردهی بیش از مقدار مورد نیاز روزانه استفاده نگردد.

■ **مقدار و نحوه مصرف فرآورده:**

■ **بزرگسالان:**

■ کمبود ویتامین ب ۶: ۲۰-۵۰ میلی گرم تا ۳ بار در روز

■ نوروپاتی ناشی از ایزونیازید:

■ پیشگیری ۱۰ میلی گرم در روز

■ درمان ۵۰ میلی گرم ۳ بار در روز

■ نوروپاتی ناشی از پنسیلامین، پیشگیری از بیماری ویلسون:

۲۰ میلی گرم روزانه



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران