



هیوسین - ان - بوتیل بروماید ۱۰ قرص

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری‌های فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک مشورت کنید:

- حساسیت به هر یک از آلکالوئیدهای بلادونا یا مشتقات آن و حساسیت به هر یک از اجزای این دارو.
- در صورت بارداری و شیردهی.
- استفاده در کودکان و افراد مسن.
- مصرف این دارو به دلیل کاهش ترشح بزاق ممکن است سبب مشکلات دندان شود.
- در صورت مصرف داروهای دیگر به خصوص آنتی کولینرژیک‌ها، آنتی اسپاسمیک‌ها، ضد اسهال، سیکلپروپان، کنتوکونازول، آرامبخش‌ها و پتاسیم کلراید.
- در صورت ابتلا به بیماری، به خصوص بیماری‌های قلبی، گلوکوما، Intestinal atony، میاستنی گراویس، انسداد دستگاه گوارشی یا مجاری ادراری، هیپرتروفی پروستات، اختلال عملکرد کلیوی، رفلاکس مری، تکی کاردی و گولیت اولسراتیو.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

- دارو را بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف نکنید.
- در صورت مصرف بیش از اندازه در اولین فرصت به اورژانس مراجعه شود.
- در موارد فعالیت زیاد و ورزش و یا هوای بسیار گرم احتیاط شود، زیرا گرمای شدید موجب شوک می‌شود.
- این دارو ممکن است موجب افزایش حساسیت چشم به نور و یا تاری دید شود.
- این دارو ممکن است باعث ایجاد سرگیجه و یا خواب‌آلودگی شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کارهایی که نیاز به دقت و هوشیاری کامل دارد خودداری کنید.
- در صورت خشکی دهان می‌توان از آدامس، آبنبات بدون شکر و یا یخ استفاده کرد. اگر خشکی دهان بیش از دو هفته ادامه پیدا کرد با پزشک یا دندانپزشک مشورت کنید.
- از مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی یا الکل خودداری کنید.
- ۲ تا ۳ ساعت پس از مصرف این دارو از مصرف داروهای آنتی اسید و ضد اسهال خودداری کنید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود، مگر با تجویز پزشک متخصص.
- هر چند مطالعات کامل در انسان و یا حیوانات انجام نشده است ولی مشخص شده است که این دارو از جفت عبور می‌کند.
- این دارو در دوران شیردهی وارد شیر می‌شود.

موارد منع مصرف:

- مصرف این دارو در موارد زیر به جز در شرایط ویژه ممنوع است:
- حساسیت به هر یک از آلکالوئیدهای بلادونا یا مشتقات آن و یا هر یک از اجزای این دارو.

در موارد زیر نسبت اثرات مفید دارو به عوارض آن در نظر گرفته شود:

مشکلات قلبی، رفلاکس مری، انسداد دستگاه گوارش، گلوکوم یا زاویه باز و بسته، هموراژی، فتق، ضعف عضلانی روده، میاستنی گراویس،

هایپرتروفی پروستات، احتباس ادراری، انسداد معده، اختلال عملکرد کلیوی، تکی کاردی، گولیت اولسراتیو.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر می‌باشد:
- بزرگسالان و بالغین: آنتی کولینرژیک، آنتی اسپاسم دستگاه گوارش، آنتی دیسپنوره ۱۰ تا ۲۰ میلی‌گرم ۳ یا ۴ بار در روز.
- مقدار مصرف بر اساس نیاز و تحمل بیمار می‌تواند تعیین شود.
- توجه: افراد مسن به مقدار مصرف معمول دارو در بزرگسالان، بیشتر حساس هستند.
- کودکان: مقدار مصرف تعیین نشده است.
- دارو را ۳۰ دقیقه تا یک ساعت قبل از غذا میل کنید.
- در صورتی که یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، ولی اگر زمان نوبت مصرف بعدی فرا رسیده باشد، مقدار مصرف بعدی را در برابر نکنید و فقط آن نوبت را مصرف کنید.

تداخلات دارویی:

آنتی اسپاسمیک، ضد اسهال‌ها، آنتی کولینرژیک‌ها یا داروهای با اثرات آنتی کولینرژیک، سیکلپروپان، کنتوکونازول، پتاسیم کلراید، داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت مشاهده هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.

عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

- عوارض ناخوار: واکنش‌های آلرژیک، گیجی، افزایش فشار داخل چشم، افت فشار وضعیتی.
- عوارضی که در صورت تداوم یا آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:
- عوارض با شیوع بیشتر: پیوست، کاهش تحریک، خواب‌آلودگی، خشکی دهان، یبونی، گلو یا پوست.
- عوارض با شیوع کمتر: کاهش ترشح شیر، کاهش ترشح بزاق، تاری دید.
- عوارض نادر: احساس نفخ، مشکل در دفع ادرار، حس ناخوشی، سردرد.
- عوارضی که در صورت ایجاد بعد از قطع دارو نیاز به مراقبت پزشکی دارند: اضطراب، کج خلقی، کابوس شبانه، اختلال در خواب.

مسمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار را سریعاً به بیمارستان منتقل کنید.

شرایط نگهداری:

- دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری گردد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

- قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید به صورت ۱۰ بلیستر ۱ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

L-T159-02

Reference: USP DI, 2007, vol 1, pages: 230 - 246



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران