



لور اتادین ۱۰ قرص

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه‌ی آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- حساسیت به هر یک از داروهای آنتی هیستامین.
- بارداری و شیردهی.
- استفاده در کودکان و افراد مسن.
- این دارو به دلیل کاهش یا مهار ترشح بزاق دهان ممکن است باعث افزایش مشکلات دندان گردد.
- در خصوص مصرف سایر داروها خصوصاً الکل یا دیگر تضعیف کننده‌های سیستم اعصاب مرکزی، آنتی کولینرژیک‌ها یا داروها با اثرات آنتی کولینرژیک، مهارکننده‌های مونوآمینواکسیداز.
- وجود بیماری‌ها خصوصاً گلوکوم با زاویه بسته، انسداد گردن مثانه، اختلال عملکرد کبدی و کلیوی، هیپرتروفی پرستات.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

- دارو را بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف ننمایید.
- در صورت فراموشی یک دوز به محض یادآوری آن را مصرف نمایید، اگر تقریباً زمان مصرف دوز بعدی رسیده است فقط آن را مصرف کرده و دوزها را دو برابر نکنید.
- جهت کاهش عوارض گوارشی دارو را همراه غذا، آب یا شیر مصرف نمایید.
- از مصرف الکل یا دیگر تضعیف کننده‌های سیستم اعصاب مرکزی خودداری نمایید.
- به دلیل ایجاد خواب آلودگی احتیاط نمایید.
- از مصرف همزمان با مسکن‌ها و آرام بخش‌ها خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

- مصرف دارو در موارد زیر به جز در شرایط ویژه ممنوع است:
- اختلال عملکرد کبدی و کلیوی.

در موارد زیر نسبت اثرات مفید دارو به عوارض آن باید در نظر گرفته شود:

- انسداد گردن مثانه، هیپرتروفی پرستات، احتباس ادراری، گلوکوم (با زاویه باز و بسته).

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در بارداری و شیردهی باید با نظر پزشک صورت پذیرد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- بزرگسالان و کودکان بالاتر از ۶ سال: آنتی هیستامین: ۱۰ میلی‌گرم به صورت خوراکی، یک بار در روز. کودکان ۲-۶ سال: آنتی هیستامین: ۵ میلی‌گرم به صورت خوراکی، یک بار در روز.

تداخلات دارویی:

- الکل، داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی، آنتی کولینرژیک‌ها یا داروهای با فعالیت آنتی کولینرژیک، مهار کننده‌های مونو آمینو اکسیداز.

عوارض جانبی:

- هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید.

- عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

- عوارض با شیوع کمتر یا نادر: شوک آنافیلاکسی، دیسکرازی خونی، آریتمی قلبی.

- عوارضی که در صورت تداوم یا آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

- عوارض با شیوع کمتر یا نادر: تاری دید، گیجی، مشکل یا درد در دفع ادرار، خواب آلودگی، افزایش اشتها یا افزایش وزن، افزایش بزاق، از دست دادن اشتها، حساسیت به نور، شنیدن صدای زنگ در گوش، راش پوستی، مشکلات گوارشی، درد معده یا تهوع، تپکی کاردی.

مسمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری گردد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

- قرص لور اتادین ۱۰ میلی‌گرم به صورت ۱۰ پلیستر ۱۰ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

L-T161-01

Reference:

1)USPDI 2007, 27th Edition, Vol 1, Drug information for health care professional, pages: 333-350



ساخت شرکت داروسازی راموفارمین
تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsuos Road, Tehran 13 98 83 41 11 - IRAN www.ramopharm.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی میتا،
خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۲۰ - ۲۱ - ۴۴ ۵۳ ۶۰ - ۲۱ - ۴۴ ۵۳ ۶۰ - ۲۱ - ۴۴ ۵۳ ۶۰ - ۲۱ - ۴۴ ۵۳ ۶۰