ناپروکسن ۲۵۰
قرص

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

■ این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن درموارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

■ وجود هر نوع حساسیت به آسپرین یا هر یک از داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی و یا به هر یک از اجزای این دارو.

■ استفاده این دارو در سه ماهه سوم بارداری و دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد.

■ استفاده در کودکان و افراد مسن.

■ در صورت ابتلا به هرنوع بیماری مخصوصا دیسکرازی خونی، نارسایی مغز استخوان، بیماری‌های قلبی یا قلبی - ریوی، مشکلات لخته شدن خون، بیماری کبدی و کلیوی، خونریزی گوارشی، زخم یا التهاب گوارشی، استوماتیت.

■ درصورت مصرف داروهای دیگر خصوصا الکل، ضدانعقادها، آسپرین، سفالوسپورین‌هایی که باعث هیپوپروترومبینمی می‌شوند، کورتیکواستروئیدهای خوراکی، سیکلوسپورین، لیتیم، متوتروکسات، پلیکامایسین، مکمل های پتاسیم، پروبنسید، تریامترن و والپرونیک اسید.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه کنید:

■ جهت کاهش عوارض گوارشی قرص ناپروکسن ۲۵۰ میلی‌گرمی را همراه با غذا و یا آنتی اسید به اضافه یک لیوان پر از آب میل نمایید.

■ دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید.

■ در صورتی که دارو برای مدت طولانی تجویز شده است لازم است که در این مدت تحت نظر پزشک باشید.

■ چنانچه دارو را ۱-۲ نوبت در روز مصرف می‌کنید در صورت فراموشی یک نوبت از دارو، اگر ۱-۲ ساعت بعد به یاد آوردید فورا دارو را مصرف نمایید. در غیر اینصورت از مصرف آن صرف نظر نمایید. چنانچه دارو را بیش از۲ نوبت در روز مصرف می‌کنید در صورت فراموشی یک نوبت از دارو، به محض به یاد آوردن آن را مصرف نمایید مگر اینکه زمان مصرف دوز بعدی رسیده باشد، در این صورت مقدار مصرف دارو را دو برابر نکنید.

■ به همراه این دارو از مصرف فرآورده‌های حاوی الکل خودداری کرده و در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرید.

■ در صورت مشاهده این علائم سریعا به پزشک خود اطلاع دهید: ادم، خونریزی یا زخم گوارشی، مشکلات قلبی، افزایش غیر طبیعی وزن و راش پوستی.

■ در صورت مشاهده علائم شبه انفولانزا سریعا به پزشک خود اطلاع دهید، زیرا این علائم می‌تواند بیانگر یک واکنش جدی به دارو باشند.

■ مصرف این دارو ممکن است باعث ایجاد گیجی و خواب آلودگی شود. لذا ضمن درمان با این دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری نمایید.

■ در صورت بروز هرگونه ناراحتی شدید دستگاه گوارش و اشکال در تنفس مصرف دارو را قطع نموده و به پزشک مراجعه نمایید.

موارد منع مصرف:

استفاده از این دارو در موارد زیر به جز در شرایط ویژه ممنوع است:

■ واکنش حساسیت شدید ایجاد شده توسط آسپرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی.

■ پلیپ بینی همراه برونکواسپاسم که توسط آسپرین ایجاد شده است.

در موارد زیر نسبت اثرات مفید به عوارض دارو در نظر گرفته شود:

■ خونریزی و زخم گوارشی، هموفیلی یا سایر بیماری‌های مربوطه شامل مشکلات انعقادی و مشکلات عملکرد پلاکت، اختلال عملکرد کلیوی، استوماتیت.

■ استفاده در افراد مسنی که احتمال ایجاد عوارض کبدی یا کلیوی در آنها بیشتر است.

هم‌چنین افرادی که زخم‌ها و خونریزی‌های گوارشی در آنها می‌تواند پیامدهای جدی در پی داشته باشد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

■ مصرف دارو در این دوران توصیه نمی‌گردد مگر به تشخیص پزشک متخصص.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

■ مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌کند. مقدار مصرف معمولی این دارو به شرح زیر است:

■ **بزرگسالان:**

ضد روماتیسم: روزانه ۱ الی ۲ قرص (۲۵۰ الی ۵۰۰ میلی‌گرم) دو یاردر روز صبح یا عصر.

ضد التهاب یا ضد درد: ۵۰۰ میلی‌گرم در ابتدا به صورت خوراکی سپس ۲۵۰ میلی‌گرم هر ۶-۸ ساعت در صورت نیاز.

■ **کودکان:**

ضد روماتیسم: ۱۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به صورت خوراکی، در دو دوز منقسم.

تداخلات دارویی:

■ الکل، کورتیکواستروئیدها و گلوکوکورتیکوئیدهای خوراکی، کورتیکوتروپین، مکمل های پتاسیم، ضد انعقادها، هپارین، عوامل ترومبولیتیک، تریامترن، آسپرین، سفامندل، سفوپرازون، سفوتتان، پلیکامایسین، والپرونیک اسید، سیکلوسپورین، لیتیم، متوتروکسات، پروبنسید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:

عوارضی که در صورت بروز نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

عوارض با شیوع بیشتر: عوارض پوستی، زنگ زدن گوش‌ها، مشکلات کلیوی، مشکل در تنفس.

عوارض با شیوع کمتر: تاری دید، زخم‌های دهانی، کاهش شنوایی، تشنگی ادامه دار.

عوارضی که در صورت تداوم یا آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

عوارض با شیوع بیشتر: گیجی، خواب آلودگی، سردرد، عوارض گوارشی، یبوست، سوزش سردل، تهوع.

عوارض با شیوع کمتر: افزایش تعریق، تپش قلب، سرگیجه، اسهال، سوءهاضمه.

مسمومیت:

■ درصورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده بیمار را به بیمارستان منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

■ دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری گردد.

■ دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

■ از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

بسته بندی:

■ قرص ناپروکسن ۲۵۰ میلی‌گرم، به صورت ۱۰ بلیستر ۱۰عددی در یک جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

L-T169-02
Reference:
USP DI 2007, VOL 1, pages: 375-419

ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

تهران، کیلومتر۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا،
خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۰۲۱ - ۴۴ ۵۳ ۶۰ ۲۰ نمابر: ۵۰ ۳۵ ۵۰ - ۰۲۱

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsuos
Road, Tehran 13 98 83 41 11 - IRAN www.ramopharmin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50