



دنبیزیل ۵ و ۱۰ قرص

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری‌های فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه‌ای آن به دیگران خودداری ننمایید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- حساسیت به دنبیزیل یا هر یک از دیگر مشتقات پی‌پریدین.
- در صورت بارداری و شیردهی
- در صورت داشتن بیماری‌های خصوصاً بیماری‌های قلبی و زخم‌های گوارشی
- قبل از انجام هرگونه جراحی

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

- دارو را مطابق دستور پزشک مصرف نمایید. مصرف بیش از اندازه تجویز شده از دارو می‌تواند باعث افزایش عوارض جانبی شود.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از دارو، از آن مصرف نظر کرده و به برنامه معمول خود باز گردید و مقدار مصرف دوز بعد را دو برابر نکنید.
- به طور مرتب با پزشک در ارتباط باشید.
- در صورت نیاز به جراحی یا درمان اورژانسی، پزشک با دندانپزشک خود را از مصرف این دارو مطلع سازید.
- مصرف دارو ممکن است سبب گیجی، خواب‌آلودگی و یا عدم تعادل شود.

موارد منع مصرف:

- مصرف دارو در موارد زیر به جز در شرایط ویژه ممنوع است:
- حساسیت به دنبیزیل یا هر یک از دیگر مشتقات پی‌پریدین.
- در موارد زیر نسبت اثرات مفید دارو به عوارض آن باید در نظر گرفته شود:
- مشکلات قلبی، زخم‌های گوارشی

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید تحت نظر پزشک باشد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند. مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر است:
- بزرگسالان: ۵-۱۰ میلی‌گرم یک بار در روز به صورت خوراکی، هنگام غروب قبل از خواب.

• کودکان

ایمنی و اثربخشی در کودکان به اثبات نرسیده است.

تداخلات دارویی:

آنتی‌کولینرژیک‌ها، داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی، کاربامازپین، دگزامتازون، فنوباریتال، فنی‌توئین، ریفامپین، آکونیست کولینرژیک، کتوکونازول، کینیدین.

عوارض جانبی:

- هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید.
- عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:
- عوارض با شیوع بیشتر: بی‌اشتهایی، اسهال، خستگی، بی‌خوابی، کرامپ عضلانی، تهوع و استفراغ.
- عوارض با شیوع کمتر: خواب‌دیدن آشفته، آرتریت، پیوست، گیجی، خونریزی غیر عادی، تکرر ادرار، سردرد، افسردگی، درد، خواب‌آلودگی، سنکوپ، کاهش وزن.
- عوارضی که در صورت تداوم یا آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:
- درد شکم و تغییرات خلق و خو

مسمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

- قرص دنبیزیل ۵ و ۱۰ میلی‌گرم به صورت ۱۰ پلیستر ۱۰ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

L-T 178 - 01

Reference:

1)USPDI 2007 ,27th Edition, Vol 2, Drug information for health care professional, pages: 1151-1153



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsuos Road, Tehran 13 98 83 41 11 - IRAN www.ramopharm.in.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه‌سازی مینا،
خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۲۰ ۶۰ ۴۴ ۴۴ ۰۲۱ - ۴۴ ۵۰ ۳۵ ۵۰ - ۲۱ - ۴۴ ۵۰ ۲۱