



قرص تور اپین ۱۰ کتورولاک ترومتامول ۱۰ میلی گرم

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- **بزرگسالان:**
ضد درد: افراد ۱۶ - ۶۴ سال با حداقل وزن ۵۰ کیلوگرم و عملکرد کلیوی نرمال: ۲۰ میلی‌گرم در ابتدا، سپس ۱۰ میلی‌گرم تا ۴ بار در روز به فاصله هر ۴ - ۶ ساعت در صورت نیاز.
افراد با وزن کمتر از ۵۰ کیلوگرم و اختلال عملکرد کلیوی: ۱۰ میلی‌گرم تا ۴ بار در روز به فاصله هر ۴ - ۶ ساعت در صورت نیاز.
■ در صورت تسکین نیافتن درد، دوز توصیه شده و تناوب آن نباید افزایش یابد.
■ حداکثر دوز روزانه نباید بیش از ۴۰ میلی‌گرم و حداکثر طول مدت درمان بیش از ۵ روز نباشد.
■ **کودکان:**
ایمنی و اثربخشی دارو در کودکان تا ۱۶ سال به اثبات نرسیده است.
■ **افراد مسن:**
ضد درد: در ادامه درمان تزریقی ۱۰ میلی‌گرم تا ۴ بار در روز به فاصله هر ۴ - ۶ ساعت در صورت نیاز.
■ برای کاهش عوارض گوارشی دارو را همراه غذا یا آنتی اسید مصرف نمایید.
■ دارو را همراه یک لیوان پر آب میل نمایید. همچنین برای کاهش خطر زخم شدن مری تا ۱۵ الی ۳۰ دقیقه دراز نکشید.

تداخلات دارویی:

- ضد انعقادها، هپارین، ترومبولیتیک‌ها، آسپرین و دیگر سالیسیلات‌ها، ضد التهاب‌های غیر استروئیدی دیگر، سفامندول، سفوپرازون، سفوتتان، پليگاماسين، والپروئیک اسید، ليتيم، متوترکسات، پروبنسید.
- **عوارض جانبی:**
■ **عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:**
عوارض با شیوع بیشتر: ادم
عوارض با شیوع کمتر: افزایش فشارخون، لکه‌های قرمز زیر پوست، راش پوستی، استوماتیت (stomatitis)
■ **عوارضی که در صورت تداوم یا آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:**
عوارض با شیوع بیشتر: درد شکم، اسهال، سرگیجه، خواب‌آلودگی، سردرد، سو، هاضمه، تهوع.
عوارض با شیوع کمتر: نفخ، یبوست، احساس پری شکم، افزایش بزاق، استفراغ.

مسمومیت:

- علیم مسمومیت: درد شکم، زخم و خونریزی گوارشی، اسیدوز متابولیک، در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو در زون نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

بسته بندی:

- قرص تور اپین ۱۰ میلی‌گرم به صورت ۳ پلیستر ۱۰ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته‌بندی می‌گردد.

راهنمای‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه‌ی آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- حساسیت به کتورولاک، آسپرین یا هر یک از داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی.
- بارداری و شیردهی
- استفاده از داروهای دیگر خصوصاً ضد انعقادها، آسپرین و دیگر سالیسیلات‌ها، ضد التهاب‌های غیر استروئیدی دیگر، سفالوسپورین‌هایی که بر انعقاد خون اثر می‌گذارند، ليتيم، متوترکسات، پليگاماسين، پروبنسید، والپروئیک اسید.
- ابتلا به بیماری‌ها خصوصاً خونریزی فعال یا سابقه آن، زخم و التهاب دستگاه گوارش، اختلال عملکرد کلیوی.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه کنید:

- دارو را بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف نکنید.
- این دارو را بیش از ۵ روز استفاده نکنید.
- در صورت فراموشی یک دوز به محض یادآوری آن را مصرف نمایید. در صورتی که زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده است از آن صرف نظر کرده و دوزها را دو برابر نکنید.
- این دارو را همراه با داروی استامینوفن بیش از چند روز استفاده نکنید.
- همچنین از مصرف همزمان این دارو با داروهای آسپرین، سالیسیلات‌های دیگر و سایر ضد التهاب‌های غیر استروئیدی خودداری نمایید، مگر طبق دستور پزشک یا دندانپزشک.
- در صورت مشاهده هر یک از این علائم سریعاً به پزشک اطلاع دهید: ادم، خونریزی گوارشی، مشکلات قلبی - عروقی، افزایش وزن غیرعادی، راش پوستی.
- مصرف این دارو ممکن است سبب گیجی یا خواب‌آلودگی گردد، لذا هنگام مصرف دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

مصرف این دارو در موارد زیر به جز در شرایط ویژه ممنوع است:

- خونریزی مغزی
- هموفیلی و مشکلات دیگر انعقادی و عملکرد پلاکتی
- خونریزی گوارشی فعال یا وجود سابقه آن
- سوختن بودن دستگاه گوارش
- زخم‌های گوارشی، کولیت روده
- پولیپ روده همراه با برونگواسپاسم، آئزیوادم، شوک آنافیلاکسی و دیگر واکنش‌های آلرژیک که با داروهای کتورولاک، آسپرین و دیگر ضد التهاب‌های غیر استروئیدی ایجاد شده باشد.
- اختلال شدید عملکرد کلیوی

در موارد زیر نسبت اثرات مفید دارو به عوارض آن باید در نظر گرفته شود:

- واکنش‌های آلرژیک خفیف مانند رینیت آلرژیک، کهیر و راش پوستی که با داروهای کتورولاک، آسپرین و دیگر ضد التهاب‌های غیر استروئیدی ایجاد شده باشد.
- بیماری التهابی روده
- کم حجمی خون (hypovolemia) یا عفونت خونی

مصرف در حاملگی و شیردهی:

- استفاده از این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود.



ساخت شرکت داروسازی راموفارمین
تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsoos Road, Tehran 139834111 - IRAN www.ramopharm.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران: کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی میا،
خیابان ولیعصر، زویری شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۲۰ ۴۴ ۵۳ ۶۰ - ۲۱ - ۴۴ ۵۰ ۳۵ ۵۰ - ۲۱ - ۴۴ ۵۰ ۳۵ ۵۰

L-T 195-01

References:

1) USPD 2007, 27th Edition, Vol 2, Drug information for health care professional, page: 1760-6