



دی سیکلومین ۱۰

قرص روکش دار

بزرگسالان :

- ضد اسپاسم گوارشی: ۱۰-۲۰ میلی گرم ۳-۴ بار در روز، حداکثر ۱۶۰ میلی گرم در روز مصرف شود.
- کودکان:
- در کودکان تا ۶ سال مصرف قرص توصیه نمی شود.
- در کودکان بالای ۶ سال مقدار ۱۰ میلی گرم ۳-۴ بار در روز مصرف می شود.
- در صورتیکه یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید. ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد مقدار آن را دو برابر نکنید.
- دارو را نیم تا یک ساعت قبل از غذا میل نمایید.

تداخلات دارویی:

- آنتاسیدها، ضد اسهال ها، آنتی کولینرژیک ها، سیکلوسپورین، کتوکونازول، پتاسیم کلراید.

عوارض جانبی:

- هارو به موارات اثرات مطلوب درمانی، ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز عوارض زیر با پزشک مشورت شود.
- عوارضی که در صورت بروز نیاز به مراقبت پزشکی دارند:
- عوارض نادر: واکنش های حساسیتی، گیجی، افزایش فشار داخل چشم، افت فشارخون وضعیتی.
- عوارضی که تنها در صورت تداوم یا آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:
- عوارض با شیوع بیشتر: پیوست، کاهش تعریق، خشکی دهان، یبوی، گلو یا پوست عوارض با شیوع کمتر یا نادر: حس نفخ، کاهش ترشح شیر، کاهش ترشح بزاق، مشکل در دفع ادرار، خواب آلودگی و سردرد.

سمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار تعیین شده، بیمار را سریعاً به بیمارستان منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری گردد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

- قرص دی سیکلومین ۱۰ میلی گرم، به صورت ۱۰ پلیستر-۱ عددی در یک جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می گردد.

راهنمای های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیفی آن به دیگران خودداری ننمایید.

قبل از مصرف دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت وجود هر نوع حساسیت به هر یک از مواد تشکیل دهنده دارو، آلکالوئیدهای پلادونا یا مشتقات آن.
- در صورت گلوکوم با زاویه باز یا بسته، بیماری های مجاری گوارشی، ازوفایت و رفلاکس، هیپرتروفی پروستات یا احتباس ادرار، بیماری های کلیوی و قلبی، میاستنی گراویس، همورژی، گولیت اولسراتیو، فلج روده ای و تاکی کاردی.
- در بیماران سالمند.
- در کودکان مبتلا به فلج اسپاسمی یا آسیب مغزی.
- در صورت بارداری و شیردهی.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

- دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف ننمایید.
- از مصرف داروهای ضد اسید معده و ضد اسهال ۲ تا ۳ ساعت بعد از مصرف دارو خودداری نمایید.
- مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی و گیجی گردد، لذا در طول درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری گردد.
- در صورت فعالیت شدید در هوای گرم احتمال بالا رفتن دمای بدن وجود دارد.
- دارو ممکن است باعث تاری دید و افزایش حساسیت به نور شود.

موارد منع مصرف:

- مصرف این دارو در موارد زیر به جز در شرایط ویژه منع است:
- حساسیت به آلکالوئیدهای پلادونا یا مشتقات آن و یا هر یک از اجزای این دارو.
- در موارد زیر نسبت اثرات مفید دارو به عوارض آن باید در نظر گرفته شود:
- بیماری قلبی، رفلاکس مری، مشکلات انسداد دستگاه گوارش، گلوکوم با زاویه باز یا بسته، همورژی، فتق، فلج روده، میاستنی گراویس، هیپرتروفی پروستات، احتباس ادراری، بیماری مجاری ادراری، اختلال عملکرد کلیوی، تاکی کاردی، گولیت اولسراتیو.

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری باید تحت نظر پزشک متخصص صورت گیرد.
- مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین

تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsuos Road, Tehran 1398834111 - IRAN www.ramopharmin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا،
خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۳۶۰۲۰ تا ۰۲۱-۴۴۵۳۶۰۲۴؛ فاکس: ۰۲۱-۴۴۵۰۳۵۵