

قرص بی پرام[®] ۲ بی پریدن ۲ میلی گرم

- اختلالات اکستراپیرامیدال ایجاد شده توسط داروها:
۲ میلی گرم ۱ تا ۳ بار در روز به صورت خوراکی.
کودکان:
ایمنی و اثربخشی در کودکان به اثبات نرسیده است.

تداخلات دارویی:

الکل، داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی، آنتی کولینرژیک ها و داروها با اثرات آنتی کولینرژیک

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

- عوارض نادر: واکنش های آلرژیک، گیجی، افزایش فشار داخل چشم
- عوارضی که در صورت تداوم یا آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:
- عوارض با شیوع بیشتر: اثرات آنتی کولینرژیک ملایم
- عوارض با شیوع کمتر یا نادر: حس کاذب سرخوشی، سردرد، از دست دادن حافظه، کرامپ عضلانی، عصبانیت، بی حسی و ضعف در دست یا پاها، افت فشارخون وضعیتی، حس دردناکی در دهان و زبان، درد معده، هیجانات غیرمعمول
- عوارض زیر ممکن است در اثر قطع دارو رخ دهند و اگر بعد از قطع دارو پس از استفاده طولانی مدت مشاهده شدند نیاز به مراقبت پزشکی دارند:
- عصبانیت، علائم اکستراپیرامیدال، ضربان قلب تند، افت فشارخون وضعیتی، مشکل درخوابیدن

مسمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری گردد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

پسته بندی:

- قرص بی پرام[®] ۲ میلی گرم به صورت ۱۰ پلیستر ۱۰ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو پسته بندی می گردد.

راهنمای های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- حساسیت به داروهای این دسته (antidyskinetics)
- شیردهی
- استفاده در کودکان و سالمندان
- کاهش یا مهار ترشح بزاق که سبب مشکلات دندان می شود.
- استفاده از سایر داروها خصوصاً آنتی کولینرژیک و تضعیف کننده های CNS
- وجود بیماری ها خصوصاً مشکلات قلبی، دیسکینزی تاخیری، گلوکوم، انسداد روده ای، میاستنی گراویس، احتباس ادراری

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه کنید:

- دارو را بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف ننمایید.
- جهت کاهش عوارض گوارشی همراه غذا مصرف شود.
- در صورت فراموشی یک دوز به محض به یاد آوردن آن را مصرف ننمایید. اگر کمتر از ۲ ساعت به دوز بعدی باقی مانده از مصرف آن صرف نظر کرده و دوزها را دو برابر نکنید.
- قبل از قطع دارو با پزشک مشورت نمایید، ممکن است کاهش تدریجی دوز ضروری باشد.
- از مصرف الکل و دیگر تضعیف کننده های سیستم اعصاب مرکزی خودداری نمایید.
- در صورت بروز تاری دید و خواب آلودگی احتیاط نمایید.
- در هنگام ورزش و آب و هوای گرم احتیاط نمایید.

موانع مصرف:

در موارد زیر نسبت اثرات مفید دارو به عوارض آن باید در نظر گرفته شود:

- مشکلات قلبی
- دیسکینزی تاخیری
- گلوکوم یا زاویه باز و بسته
- انسداد روده ای
- میاستنی گراویس
- احتباس ادراری

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

بزرگسالان:

■ پارکینسونیسم:

۲ میلی گرم یا ۴ بار در روز به صورت خوراکی، دوز با توجه به نیاز و تحمل بیمار تنظیم می شود.



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران