



کلسی رام - د®

قرص کلسیم (بصورت کریبات) ۵۰۰ میلی‌گرم + ویتامین د ۳۰۰ واحد بین‌المللی

که مصرف بیش از این مقدار با توجه به نوع بیماری توسط پزشک تعیین می‌گردد.
کودکان:
 مصرف کلسی رام - د® در کودکان زیر ۸ سال توصیه نمی‌شود.

عوارض جانبی:

■ از مهمترین عوارض جانبی کلسیم - د می‌توان به هیپرکلسمی، تهوع و استفراغ، سردرد، یبوست، درد شکم، نفخ، بی‌اشتهایی، خشکی دهان اشاره کرد.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر همزمان با این فرآورده، با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:
 ■ آنتی‌بیوتیکها (کینولون‌ها و تتراسایکلین‌ها)، دیورتیکها (تیازیدها)، بیس فسفونات‌ها، لووتیروکسین، بیزاگودیل، کورتیکواستروئیدها و سایر املاح کلسیم، گلیکوزیدهای قلبی، دیگوکسین، آنتی‌اسیدهای حاوی منیزیم، کلستیرامین، کتوکونازول، فنی‌توئین، فنتوباریتال، روغن‌های معدنی.

مسمومیت:

■ در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد، به مراکز کنترل مسمومیت مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

■ فرآورده دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.
 ■ فرآورده دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
 ■ از مصرف فرآورده تاریخ گذشته خودداری نمایید.

بسته بندی:

■ قرص کلسی رام د® بصورت ۵ پلیستر ۱۰ عددی در یک جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای فرآورده بسته بندی می‌گردد.

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح فرآورده:

این فرآورده مکمل است و جهت تشخیص، پیگیری و درمان نمی‌باشد.

قبل از استفاده از این فرآورده در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

■ حساسیت به تارترازین
 ■ سابقه سنگ کلیه
 ■ در صورت بارداری و شیردهی
 ■ حساسیت به ویتامین د۳
 ■ مصرف همزمان از سایر فرآورده‌های حاوی کلسیم و ویتامین د۳
 ■ بیماران کلیوی، قلبی و به ویژه بیمارانی که از داروهای گلیکوزیدهای قلبی استفاده می‌کنند، کلیه املاح کلسیم باید با احتیاط مصرف شود.
 ■ مصرف طولانی مدت کلسیم - د باعث هیپرکلسمی و هیپرکلسمی اوری می‌شود. این موارد در بیماران مبتلا، به هیپوپاراتیروئیدی که مقدار زیادی ویتامین D3 مصرف می‌کنند شایع‌تر است بنابراین باید با احتیاط مصرف شود.

موارد منع مصرف:

■ هیپرکلسمی، فیبریلیسیون بطنی، وجود شواهدی از سمیت ویتامین د۳، سو-جذب، حساسیت غیرعادی به ویتامین د۳، اختلال عملکرد کلیوی.

مصرف در بارداری و شیردهی:

■ در دوران بارداری و شیردهی طبق دستور پزشک و با احتیاط مصرف شود.

مورد مصرف:

■ کمک به سلامت استخوان‌ها

مقدار و نحوه مصرف:

■ فرآورده را بعد از غذا به همراه یک لیوان آب مصرف نمایید.
 ■ بهترین است بین مصرف کلسی رام - د® و سایر داروها ۲-۳ ساعت فاصله باشد.
 ■ مقدار مصرف معمولی کلسی رام - د® بشرح ذیل است:
 ■ این قرص حاوی ۵۰۰ میلی‌گرم کلسیم و ۲۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین D3 می‌باشد و معمولاً یک تا دو قرص در روز مصرف می‌گردد

L-T21137-02

References:

1) Drug Facts and Comparisons, 2015, Vol 1, pages 41- 47

2) Martindale, 2009, 36th Edition, Vol 1, pages 1692 -1714

3) www.updodate.com



ساخت شرکت داروسازی راموفارمین
 تهران - ایران