



آنتی میگرامین® ۵۰

سوماتریپتان

- قرص آنتی میگرامین® (سوماتریپتان) جهت تسکین دردهای میگرنی تجویز می‌گردد و در پیشگیری حملات میگرن نقش ندارد.
- حداکثر دوز روزانه در بزرگسالان ۲۰۰ میلی گرم در ۲۴ ساعت می‌باشد.
- حداکثر دوز روزانه در افراد با اختلال عملکرد کبدی، نباید از ۵۰ میلی‌گرم بیشتر باشد.
- مصرف قرص آنتی میگرامین® (سوماتریپتان) فقط در زمان شروع حملات میگرن می‌باشد.
- دارو را به‌طور کامل بلعید و از شکستن، جویدن و خرد کردن آن خودداری نمایید.
- دارو را با یک لیوان پراز آب مصرف نمایید.

تداخلات دارویی:

مهارکننده‌های مونوآمینوآکسیداز، مهارکننده‌های باز جذب سروتونین (فلوکستین، سرتراپین، فلووکسامین، پاروکستین)، دی هیدروارگوتامین.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، ولی در صورت بروز هر عارضه‌ای با پزشک مشورت شود.

عوارضی که در صورت بروز نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:

- عوارض با شیوع کمتر: درد شدید قفسه سینه، اشکال در بلع، سنگینی و احساس فشار در قفسه سینه و یا گردن.
- عوارض نادر: شوک آنافیلاکسی، واکنش‌های پوستی، آلرژی، حمله صرع.

عوارض زیر تنها در صورت تداوم یا آزاردهنده بودن نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند:

- عوارض با شیوع بیشتر: تهوع یا استفراغ
- عوارض با شیوع کمتر: حس غیرطبیعی (حس سوختن، سرما و ...)، احساس ناراحتی در فک، دهان، گلو، زبان، حفره بینی یا سینوس‌ها، گیجی یا خواب آلودگی، گرگرفتگی، حواس پرتی، درد و خشکی عضلانی، ضعف.

مسمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری گردد.

بسته بندی:

- قرص آنتی میگرامین® به صورت یک پلیستر ۴ عددی و یا یک پلیستر ۱۰ عددی داخل جعبه مقوایی به همراه برگه ی راهنمای دارو بسته بندی می‌گردد.

راهنمای‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- وجود هر نوع حساسیت به آنتی میگرامین® (سوماتریپتان) و مواد دیگر از قبیل داروها، غذاها، مواد محافظ و رنگ‌ها.
- در صورت مصرف داروهای دیگر خصوصاً مهارکننده‌های مونوآمینوآکسیداز.
- در صورت ابتلا به بیماری‌هایی نظیر بیماری‌های قلبی و عروقی (آنژین، انفارکتوس میوکارد)، مشکلات عروق مغزی، بیماری‌های کبدی، بالا بودن فشارخون (کنترل نشده)، تکی گاردی.
- در صورت بارداری و شیردهی.
- مصرف این دارو در کودکان و سالمندان توصیه نمی‌شود.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

- در صورت ایجاد نشانه‌های غیر عادی سردرد، دارو مصرف نشود و با پزشک ملاقات گردد.
- در صورتی که دوز اول دارو پاسخ مناسب را ایجاد نکرد، دوز اضافه مصرف نشود.
- در صورت بازگشت میگرن بعد از درمان اولیه، در صورت نیاز دوز بیشتری مصرف نمایید. در نظر داشته باشید که مقدار و دفعات تجویز از حد توصیه شده بیشتر نشود.
- در صورت نیاز به درمان پیشگیرانه، طبق دستور پزشک درمان را ادامه دهید.
- این دارو ممکن است سبب گیجی و خواب آلودگی گردد.

موارد منع مصرف:

- استفاده از این دارو در موارد زیر، به جز در شرایط ویژه ممنوع است:
- بیماری‌های قلبی - عروقی، شرایطی که انقباض عروق قلبی زبان‌آور خواهد بود، فشارخون کنترل نشده.
- در موارد زیر نسبت اثرات مفید دارو به عوارض باید در نظر گرفته شود:
- تکی گاردی، حوادث عروق مغزی یا سابقه آن، بیماری‌های قلبی - عروقی، اختلال عملکرد کبد و کلیه، حساسیت به سوماتریپتان.

مصرف در بارداری و شیردهی:

■ مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود مگر به تجویز پزشک.

نحوه مصرف دارو:

■ مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند. مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

■ ضد میگرن:

- ۲۵، ۵۰ یا ۱۰۰ میلی‌گرم در یک دوز واحد.
- در صورت نیاز به دوز بیشتر، تا ۱۰۰ میلی‌گرم با فاصله حداقل ۲ ساعت از دوز قبلی می‌تواند مصرف شود. پاسخ به دوزهای این دارو در هر فرد متفاوت است و انتخاب دوز باید بر این اساس باشد.

