



سیستین ب ۶ زینک

قرص روکش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح قرآورده:

- این قرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا تومییه آن به دیگران خودداری نمایید.
- این قرآورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری نمی باشد.

موارد مصرف:

- کمک به سلامت پوست، مو و ناخن.
- هر قرص حاوی:
 - ۵۰۰ میلی گرم - سیستین
 - ۱/۵ میلی گرم - آرژنین
 - ۶/۳۵ میلی گرم - ویتامین ب ۶
 - ۲/۵ میلی گرم - زینک

هنگام مصرف قرآورده به نکات زیر توجه نمایید:

- در صورت مصرف همزمان این قرآورده با داروهای لوودوپا، فنی تونین جهت تنظیم دوز مصرفی با پزشک مربوطه مشورت گردد.
- در صورت مصرف همزمان با سایر قرآورده ها/ داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- بیماران مبتلا به بیماری های کبدی، تنفسی، کلیوی و قلبی و دیابت قرآورده را تحت نظر پزشک مصرف نمایند.

موارد منع مصرف:

- در صورت حساسیت به هر یک از اجزای قرآورده.

عوارض جانبی:

- این محصول معمولا به خوبی توسط افراد تحمل می شود و عوارض جانبی متداول با این محصول گزارش نشده است.
- هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
- مور مور شدن دست و پا، ناهماهنگی عضلات، گر گرفتگی، سردرد، تهوع، استفراغ، اسهال.

مقدار و نحوه مصرف قرآورده:

- به مدت ۳ تا ۴ ماه روزانه ۴ قرص همراه وعده های غذایی میل نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این قرآورده در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک متخصص صورت گیرد.

تداخلات دارویی:

- تداخلات دارویی رایج با این محصول گزارش نگردیده است.
- مصرف همزمان زینک با فلوروکینولون ها (سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین و ...) و تتراسایکلین ها باعث کاهش جذب داروهای مذکور می شود.
- مصرف همزمان پنی سیلایم، ترکیبات حاوی آهن و فسفر و برخی غذاها (سیوس، پروتئین، موادمعدنی) ممکن است باعث کاهش جذب زینک گردد.
- داروهای حاوی لوودوپا، فنی تونین.

مسمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را سریعاً به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- قرآورده در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری گردد.
- قرآورده دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

- قرص سیستین ب ۶ زینک به صورت ۳ و ۶ پلیستر ۲۰ عددی در جعبه مقوایی ۶ و ۱۲۰ عددی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می گردد.

L-T219-05

References:

1) Drug Facts and Comparisons, 2015, Vol 1, pages 25, 67- 68

154-155

2)Martindale 2009, The Complete Drug Reference, 36th Edition, pages: 1928-9



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین

تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsvos
Road, Tehran 13 98 83 41 11 - IRAN www.ramopharmin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا،
خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۲۰ - ۶۰ ۵۳ ۴۴ - ۲۱ - ۵۰ ۳۵ ۴۴ - ۲۱