



قرص فروس سولفات (معادل ۵۰ میلی گرم یون آهن II)

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح قرآورده:

- این قرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- این قرآورده مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌ها نمی‌باشد.

قبل از مصرف قرآورده به نکات زیر توجه نمایید:

- حساسیت به آهن و یا هریک از اجزای این قرآورده.

هنگام مصرف قرآورده به نکات زیر توجه نمایید:

- افراد با سطح آهن نرمال نباید از قرآورده‌های آهن به صورت مزمن استفاده نمایند.
- در صورت مشاهده علائم عدم تحمل به قرآورده، مصرف آن را قطع کرده و به پزشک خود اطلاع دهید.
- مصرف این قرآورده در افراد با زخم گوارشی و کویت اولسراتیو توصیه نمی‌شود.
- ناراحتی‌های گوارشی مانند تهوع، ممکن است با مصرف قرآورده همراه غذا و افزایش آهسته دوز آن تا مقدار توصیه شده، کاهش پیدا کند.
- این قرآورده ممکن است سبب تیره رنگ شدن مدفوع گردد.
- بین مصرف این قرآورده و داروهای آنتی اسید، تتراسایکلین‌ها و فلوروکینولون‌ها حداقل ۲ ساعت فاصله باشد.
- در صورت مصرف همزمان با سایر قرآورده‌ها / داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- این قرآورده با دوز بالا می‌باشد و با توجه به اینکه ۱۱ درصد بالاتر از حداکثر مقدار مصرف مجاز روزانه است، می‌بایستی حتماً با مشورت پزشک یا داروساز مصرف شود.

موارد منع مصرف:

- بیماری هموکروماتوز (Hemochromatosis)، هموسیدروسیس (Hemosiderosis)، آتمی همولیتیک.
- حساسیت قطعی به هریک از اجزای این قرآورده.

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این قرآورده در بارداری و شیردهی باید تحت نظر پزشک باشد.

مورد مصرف:

- کمک به تامین آهن مورد نیاز بدن و جلوگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن.

مقدار و نحوه مصرف قرآورده:

- مقدار مصرف معمول قرآورده به شرح زیر است:
- جلوگیری از کمبود آهن:
- بزرگسالان: یک قرص روزانه.
- درمان کمبود آهن:
- بزرگسالان: یک قرص ۲ تا ۴ بار در روز.
- قرآورده را با معده خالی مصرف نمایید. در صورت ایجاد مشکلات گوارشی بعد از غذا میل شود.

تداخلات دارویی:

- آنتی اسیدها، فلوروکینولون‌ها (مانند سپیروفلوکساسین، لووفلوکساسین و ...)، تتراسایکلین‌ها، بیس فسفونات‌ها، نمک‌های کلسیم، انتاکاچون، لوودوپا، متیل دوبا، مایکونولات، پنی سیلایم، لووتیروکسین، سفالوسپورین‌ها، کاپتوپریل، هورمون‌های تیروئیدی.
- مصرف همزمان این قرآورده با غذاهایی مانند حبوبات، چای، قهوه، تخم مرغ و شیر ممکن است باعث کاهش جذب آن شوند.

عوارض جانبی:

- هر قرآورده به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.
- در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
- درد شکم، یبوست، اسهال، تهوع، استفراغ، تیره رنگ شدن مدفوع، مشکلات گوارشی.

مسمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را سریعاً به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- قرآورده دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.
- قرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

- قرص فروس سولفات به صورت ۱۰ پلیستر ۱۰ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای قرآورده بسته بندی می‌گردد.

References:

- 1) Drug Facts and Comparisons 2015, Vol 1, page: 51-53
- 2) British national formulary 68, 2015, page: 646-7
- 3) www.updatdate.com



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران