



آلوپورینول ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم قرص

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه‌ای آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

■ مصرف سایر داروها خصوصاً کومارین، برخی ضد انعقادها، آرتیوپرین و مرکاپتوپورین.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

■ جهت کاهش عوارض گوارشی دارو را بعد از غذا میل نمایید.

■ دوره درمان را کامل نمایید.

■ سایر داروهای تجویز شده جهت حملات نقرس خود را ادامه دهید.

■ در صورت فراموشی یک دوز به محض یادآوری آن را مصرف نمایید. در صورتی که زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده است فقط آن را مصرف کرده و دوزها را دو برابر نکنید.

■ در صورت ایجاد راش پوستی یا علائم شبه آنفولانزا که همراه راش پوستی یا کمی بعد آن اتفاق می‌افتد، سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید. ندرتاً این علائم می‌تواند نشان دهنده‌ی شروع یک واکنش حساسیتی شدید باشد.

■ این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی گردد.

موارد منع مصرف:

در موارد زیر نسبت اثرات مفید دارو به عوارض آن باید در نظر گرفته شود:

■ حساسیت به آلوپورینول یا سابقه آن.

■ اختلال عملکرد کلیوی و یا هر بیماری که باعث تغییر در عملکرد کلیه شود مانند بیماری احتقانی قلب، دیابت ملیتوس، افزایش فشارخون.

مصرف در بارداری و شیردهی:

■ مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید تحت نظر پزشک باشد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

■ بزرگسالان

■ ضد نقرس:

دوز شروع: ۱۰۰ میلی‌گرم خوراکی یک بار در روز، که می‌تواند ۱۰۰ میلی‌گرم در هفته افزایش یابد تا زمانی که سطح سرمی اوریک اسید به سطح نرمال برسد. دوز مصرفی در روز نباید از ۸۰۰ میلی‌گرم بیشتر باشد. دوز نگهدارنده: ۱۰۰ - ۲۰۰ میلی‌گرم خوراکی، ۲-۳ بار در روز، یا ۳۰۰ میلی‌گرم در روز در یک دوز واحد. دوز نگهدارنده معمول در نقرس متوسط ۲۰۰ - ۳۰۰ میلی‌گرم در روز یا ۴۰۰ - ۶۰۰ میلی‌گرم در روز در موارد شدیدتر می‌باشد.

■ درمان بیماری‌های نئوپلاستیک:

دوز شروع: ۸۰۰ - ۶۰۰ میلی‌گرم در روز که ۱۲ ساعت تا ۳ روز قبل از شروع شیمی درمانی یا رادیوتراپی تجویز می‌شود.

دوز نگهدارنده: دوز براساس سطح سرمی اوریک اسید ۴۸ ساعت بعد از تجویز دوز شروع آلوپورینول، تعیین می‌گردد.

■ کودکان

پایین آورده‌ی اسید اوریک در درمان بیماری‌های نئوپلاستیک:

کمتر از ۶ سال: ۵۰ میلی‌گرم خوراکی ۳ بار در روز.

۶ - ۱۰ سال: ۱۰۰ میلی‌گرم خوراکی ۳ بار در روز یا ۳۰۰ میلی‌گرم روزانه در یک دوز واحد.

■ برای کاهش عوارض گوارشی دارو را بعد از غذا مصرف نمایید.

■ دارو را همراه مقادیر زیاد مایعات میل نمایید.

تداخلات دارویی:

■ ضد انعقادها، آرتیوپرین، مرکاپتوپورین.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارضی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

عوارض با شیوع بیشتر: درماتیت، آلرژی.

عوارض نادر: آگرانولوسیتوز، آتمی، واسکولیت، حساسیت، آتمی آپلاستیک، درماتیت اکسفولیاتیو (exfoliative)، اریتم مولتی فرم، سمیت کبدی، واکنش‌های حساسیتی ایجاد شده توسط آلوپورینول، افتادن ناخن‌ها، بیماری toxic epidermal necrolysis، التهاب اعصاب محیطی، سنگ کلیه، اختلال کلیوی حاد، سندرم استیون - جانسون، ترومبوسیتوپنی، خونریزی از بینی بی دلیل.

عوارضی که در صورت تداوم یا آزار دهنده بودن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

عوارض با شیوع کمتر یا نادر: اسهال، خواب آلودگی، سردرد، سو، هاضمه، تهوع یا استفراغ بدون عللانی مانند راش پوستی، تب، لرز و درد عضلانی، درد معده، ریزش موی غیر طبیعی.

سمومیت:

■ در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

■ دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.

■ دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

قرص آلوپورینول ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم به صورت ۱۰ بسته ۱۰ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته‌بندی می‌گردد.

L-T22-00

Reference:

قرص آلوپورینول ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم در روز ۳ ساعت تا ۳ روز قبل از شروع شیمی درمانی یا رادیوتراپی تجویز می‌شود.

for health care professional, pages: 69-74



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsuos Road, Tehran 1398834111 - IRAN. www.ramofarmin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا،
خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۰۲۱ - ۴۴ ۵۳ ۶۰ ۲۰ - ۲۴؛ نمابر: ۰۲۱ - ۴۴ ۵۰ ۳۵ ۵۰