محلول خوراکی
لوپرامید

هر ۵ میلی لیتر محلول خوراکی لوپرامید، حاوی ۱ میلی گرم لوپرامید هیدروکلراید و ۳/۵ میلی گرم اسید بنزوییک می باشد.
لوپرامید با کند کردن حرکات روده از اسهال جلوگیری می کند.

راهنمایی های عمومی:
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
- در صورت بروز هرگونه واکنش آلرژیک یا غیرمعمول پس از مصرف دارو حتما پزشک معالج خود را مطلع سازید.
- در صورت وجود حساسیت به هر گونه مواد غذایی، رنگ ها، مواد نگهدارنده و یا حیوانات و ... به پزشک معالج اطلاع دهید.
- در صورت ابتلاء به هرگونه بیماری و مصرف سایر داروها
- مصرف در بیماران سالمند و درکودکان
- مصرف در دوران بارداری و شیردهی
- ابتلاء به اسهال حاد یا اسهال ناشی از مصرف انتی بیوتیکها، التهاب شدید روده (کولیت) ، کمی آب بدن

موارد منع مصرف:
این دارو در موارد زیر ممنوعیت مصرف دارد:
- کولیت شدید
- اسهال ناشی از درمان با آنتی بیوتیک ها یا وسیع الطیف
- اسهال حاد همراه با مدفوع خونی و تب بالا
- واکنش حساسیتی قبلی به لوپرامید
- کودکان زیر ۲ سال (نسبت اثرات مفید دارو به عوارض آن باید در زمان از دست دادن آب بدن و نارسایی عملکرد کبدی در نظر گرفته شود)

مصرف در بارداری و شیردهی:
مطالعات کافی و خوبی در زنان باردار صورت نگرفته است لذا مصرف این دارو باید با تجویز پزشک معالج صورت گیرد.

هشدارها و موارد احتیاط:
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- دارو را بیشتر از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف نکنید.
- مقادیر مصرف بیش از حد تجویز پزشک می تواند سبب بروز مشکلات قلبی حجی و یا حتی مرگ شود.
- مصرف این دارو در سالمندان و کودکان ۶ تا ۱۲ سال باید حتما با تجویز پزشک معالج و با رعایت صرف مقدار کافی آب و مایعات باشد تا بیمار دچار علایم کم آبی بدن و مشکلات جسمانی حتی نشود.
- جابجگیری مایعات و الکترولیتها بسته به شدت اسهال در تمام سنین لازم است.

در صورت بروز پیوست، دردهای شکمی و انسداد روده، مصرف دارو باید قطع شود.
در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی، این دارو با احتیاط مصرف شود و علایم عمومیت سیستم اعصاب مرکزی پایش گردد.
- اگر اسهال بیش از دو روز طول کشید بلافاصله مصرف دارو را قطع و با پزشک معالج صورت گنید.
- چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش گردید، در نوبت بعدی، مصرف دارو را دو برابر نکنید.
- بدلیل وجود ماده بنزوییک اسید در این دارو، مصرف این فراورده در نوزادان تازه متولد شده (تا ۴ هفتگی) ممکن است احتمال ابتلا به یرقان (زرد شدن پوست و چشم ها) را افزایش دهد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:
میزان مصرف هر دارو باید مطابق تجویز پزشک معالج باشد ولی به طور معمول مقدار مصرف این دارو به صورت ذیل است :

بزرگسالان و نوجوانان
در اسهال حاد یا اسهال مسافرتی:
۴ میلی گرم (معادل ۴ پیمانه ۵ میلی لیتری) از راه خوراکی و بعد از اولین اجابت مزاج شل، سپس ۲ میلی گرم (معادل ۲ پیمانه ۵ میلی لیتری) بعد از هر اجابت مزاج شل باید مصرف شود (توجه: حداکثر مقدار مجاز مصرف روزانه ۱۶ میلی گرم است)

کودکان ۶ تا ۱۲ سال (با وزن بیش از ۳۰ کیلوگرم): ۲ میلی گرم (معادل ۲ پیمانه ۵ میلی لیتری) بعد از اولین اجابت مزاج شل و سپس ۱ میلی گرم (معادل ۱ پیمانه ۵ میلی لیتری) بعد از هر اجابت مزاج شل از راه خوراکی (توجه: حداکثر مقدار مجاز مصرف روزانه ۸ میلی گرم (معادل ۵ پیمانه ۵ میلی لیتری با تجویز پزشک است)

کودکان ۶ تا ۸ سال (با وزن ۲۰ تا ۳۰ کیلو گرم): ۲ میلی گرم (معادل ۲ پیمانه ۵ میلی لیتری) بعد از اولین اجابت مزاج شل و سپس ۱ میلی گرم (معادل ۱ پیمانه ۵ میلی لیتری) بعد از هر اجابت مزاج شل از راه خوراکی (توجه: حداکثر مقدار مجاز مصرف روزانه ۴ میلی گرم (معادل ۴ پیمانه ۵ میلی لیتری با تجویز پزشک است)

کودکان کوچکتر از ۶ سال: در کودکان کوچکتر از ۶ سال مصرف این دارو توصیه نمی شود مگر با تجویز پزشک معالج

در کودکان بالای ۱۲ سال: مقدار مصرف دارو همانند بزرگسالان است.

در اسهال مزمن:
مقدار مصرف دارو در شرایط مزمن در کودکان تعیین نشده است.

تداخل های دارویی:
- جهت جلوگیری از تداخلات دارویی خطرناک حتما در مورتیکه از داروهای دیگری استفاده میکنید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
- مصرف همزمان لوپرامید با ضد دردهای اپیوئیدی احتمال بروز پیوست شدید را افزایش میدهد.

عوارض جانبی:
دارو به موازات اثرات در مانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمیشود. در صورت بروز هر یک از عوارض زیر بلافاصله با پزشک خود مشورت نمایید:
- واکنشهای آلرژیک (بثورات پوستی، فراخی کولون سمی (Toxic mega Colon) با عایم نفخ، پیوست، بی اشتهایی و درد شدید معده همراه با تهوع و استفراغ.
- از دست دادن آب بدن بدلیل اسهال ممکن است سبب بروز علایمی نظیر: گیجی یا خواب آلودگی، سرگیجه، خشکی دهان و افزایش تشنگی، کاهش ادرار، نفخ و درد شکم، از دست دادن اشتها و پیوست شود لذا در صورت مشاهده چنین علائمی بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

مسمومیت:
در صورت مصرف اتفاقی دارو بیش از مقدار توصیه شده، بیمار را بلافاصله به نزدیکترین مرکز درمانی، بیمارستان و یا مرکز کنترل مسمومیت ها منتقل نمایید تا اقدام درمانی لازم صورت گیرد.

شرایط نگهداری:
دارو در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و گرما نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.

بسته بندی:
دارو در شیشه های ۶۰ میلی لیتری تیره رنگ با درب آلومینیومی همراه با پیمانه مدرج و برگه راهنمای بیمار بسته بندی میشود.

References:
1) USPDI 2007,27th Edition;Volume II,Drug Information for the health care professional, Page 1854

2) European medicines agency,
9 October 2017, EMA/CHMP 272866

ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsuos Road, Tehran 1398834111 - IRAN www.ramopharmin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا، خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۴۴۵۳۶۰۲۰ - ۰۲۱ نمابر: ۵۰ ۳۵ ۵۰ - ۴۴ - ۰۲۱