

لوپرامید ۲ میلی گرم قرص خط دار

راهنمای های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه ی آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- ۱- وجود هر نوع حساسیت به لوپرامید
- ۲- در صورت ابتلا، به هر گونه بیماری یا مشکل پزشکی مانند اسهال حاد یا اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیکها، التهاب شدید روده (کولیت)، کمی آب بدن
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- سالمندان و کودکان
- ۵- بارداری و شیردهی

موارد منع مصرف:

- این دارو در موارد زیر نباید مصرف شود مگر به تجویز پزشک:
- ۱- کولیت شدید
 - ۲- اسهال ناشی از درمان با آنتی بیوتیک های وسیع الطیف
 - ۳- اسهال حاد همراه با مدفوع خونی و تب بالا
 - ۴- واکنش های حساسیتی قبلی به لوپرامید
 - ۵- کودکان زیر ۲ سال
- در موارد زیر نسبت اثرات مفید دارو به عوارض آن باید در نظر گرفته شود:
- ۱- از دست دادن آب بدن
 - ۲- نارسایی عملکرد کبدی

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده ای در زنان باردار صورت نگرفته است، لذا مصرف آن باید با تجویز پزشک معالج صورت گیرد.
- مصرف این دارو در شیردهی توصیه نمی شود.

شدها و موارد احتیاط:

- ۱- مصرف لوپرامید در صورتیکه اسهال همراه با تب بالا یا خون در مدفوع باشد، نباید صورت گیرد.
- ۲- در کودکان به دلیل احتمال از دست رفتن آب بدن باید با احتیاط مصرف شود.
- ۳- جایگزینی مایعات و الکترولیتها بسته به شدت اسهال، در تمام سنین لازم است.
- ۴- در صورت بروز بیوست، دردهای شکمی و انسداد روده، مصرف دارو باید قطع شود.
- ۵- در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی، با احتیاط مصرف گردیده و علائم سمومیت سیستم اعصاب مرکزی پایش گردد.
- ۶- اگر اسهال بیش از روز طول کشید، مصرف دارو باید قطع گردیده و با پزشک معالج مشورت شود.
- ۷- مصرف لوپرامید در کودکان ۲ تا ۶ سال توصیه نمی شود، مگر اینکه طبق تجویز پزشک متخصص باشد.
- ۸- چنانچه یک توبت از دارو را فراموش کردید، آن توبت را مصرف نکرده و در توبت بعدی نیز مقدار دارو را دو برابر نکنید.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:
- بزرگسالان:
- اسهال حاد یا اسهال مسافرتی: ۴ میلی گرم از راه خوراکی بعد از اولین تخلیه آبی روده (بیرون روی) و سپس ۲ میلی گرم به دنبال هر بیرون روی آبی دیگر.
- اسهال مزمن: ابتدا ۴ میلی گرم از راه خوراکی، سپس ۲ میلی گرم

بعد از هر بیرون روی آبی روده تا زمانیکه اسهال کنترل شود. دوز نگهدارنده: ۴ تا ۸ میلی گرم روزانه در دوزهای منقسم برحسب نیاز می باشد.

حداکثر مقدار مصرف لوپرامید روزانه ۸ میلی گرم فقط برای ۲ روز می باشد؛

کودکان:

اسهال حاد یا اسهال مسافرتی:

بطور کلی درمان اسهال در کودکان از طریق تامین آب بدن از راه خوراکی و تغذیه مناسب بر درمان دارویی ارجحیت دارد.

مقدار مصرف دارو در کودکان را پزشک تعیین میکند. ولی به طور معمول در کودکان ۶ تا ۱۱ سال دوز شروع درمان، روزانه ۰/۸ تا ۰/۲۴ میلی گرم لوپرامید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ۲ تا ۳ دوز منقسم می باشد.

کودکان ۶ تا ۸ سال: در شروع ۲ میلی گرم بعد از اولین بیرون روی آبی روده و سپس ۱ میلی گرم بعد از هر بیرون روی آبی از راه خوراکی مصرف می شود.

مصرف بیش از ۴ میلی گرم در روز مجاز نمی باشد.

کودکان ۹ تا ۱۱ سال: در شروع ۲ میلی گرم بعد از اولین بیرون روی آبی روده و سپس ۱ میلی گرم بعد از هر بیرون روی آبی از راه خوراکی مصرف می شود.

مصرف بیش از ۶ میلی گرم در روز مجاز نمی باشد.

مقدار مصرف در کودکان بزرگتر از ۱۲ سال همانند بزرگسالان می باشد. اسهال مزمن: در این مورد مقدار مصرف دارو در کودکان تعیین نشده است.

تداخل های دارویی:

مصرف همزمان لوپرامید با ضد دردهای اپیوپئیدی، احتمال بروز بیوست شدید را افزایش می دهد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

نادر - واکنشهای آلرژیک (بثورات پوستی): فراخی کولون سمی (toxic megacolon) با علائم نفخ، بیوست، بی اشتها و درد شدید معده همراه با تبوع و استفراغ.

عوارضی که در صورت تحاوم نیاز به توجه پزشکی دارند:

نادر - گیجی یا خواب آلودگی و خشکی دهان

سمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

- قرص های لوپرامید ۲ میلی گرم، به صورت ۱۵ پیوستر ۱۰ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می گردد.

L-T256-00

References:

1) USP DI 2007, 27th Edition, Vol 1, Drug information for health care professional, pages: 1852-1854

2) Lexicomp's Drug Information Handbook 21st Edition, pages-1098-1099



ساخت شرکت داروسازی راموفارمین
تهران - ایران