



تریامترن ۵۰/هیدروکلروتیازید ۲۵ قرص

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید تحت نظر پزشک صورت گیرد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- بزرگسالان
- ضد فشار خون بالا یا دیورتیک: ۱ یا ۲ قرص دو بار در روز به صورت خوراکی.

تداخلات دارویی:

- لیتیم، آلوپورینول، کلشی سین، پروپنسید، سولفین پیرازون.

عوارض جانبی:

- هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید.
- عدم تعادل الکترولیت ها، اگرانولوسیتوزیس، واکنش های حساسیتی، کوله سیستیت یا پانکراتیت، نقرس یا هایپراوریسمی، اختلال عملکرد کبدی، ترومبوسیتوپنی، مگالوبلاستوزیس، nephrolithiasis.

مسمومیت:

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری گردد.
- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.

بسته بندی:

- قرص تریامترن اچ ۲۵/۵۰ به صورت ۱۰ پلیستر ۱۰ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای دارو بسته بندی می گردد.

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا تومیهی آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- حساسیت به دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم، هیدروکلروتیازید یا دیگر دیورتیک های تیازیدی، دیگر داروهای سولفونامیدی، بومتانید، فوروزماید یا مهارکننده کربونیک انهیدراز.
- در صورت بارداری و شیردهی.
- استفاده در افراد مسن.
- استفاده از سایر داروها مخصوصا مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، کلسیترامین، کلسیپول، کومارین یا ضد انعقادهای indandione، سیکلوسپورین، گلیکوزیدهای دیجیتالی، هیارین، لیتیم، شیر کم نمک، دیگر دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم، داروها و مکمل های حاوی پتاسیم، خون ذخیره شده از بانک خون.
- وجود بیماری ها مخصوصا نروپاتی دیابتی، اختلال عملکرد کبدی و کلیوی.

هنگام مصرف دارو به نکات زیر توجه نمایید:

- ضمن درمان با این دارو از قرار گرفتن در مقابل تابش آفتاب و لامپ های آفتابی به مدت طولانی خودداری نمایید.
- در صورت فراموشی یک نوبت به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید. اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده بود از مصرف دوز فراموش شده خودداری کرده و دوز دارو را دو برابر نکنید.
- در صورت استفاده به عنوان داروی ضد فشارخون بالا بیمار ممکن است علائم فشارخون بالا را تجربه نکند، اما مصرف دارو حتی در صورت احساس بهبود باید ادامه پیدا کند. قبل از قطع دارو حتما با پزشک مشورت نمایید.
- احتمال افزایش یا کاهش پتاسیم در بدن وجود دارد. ممکن است که نیاز به بررسی سطح پتاسیم در رژیم غذایی باشد قبل از تغییر رژیم غذایی با پزشک مشورت نمایید.
- داروهای دیگر مخصوصا سیمپاتومیمتیک های بدون نسخه را بدون مشورت با پزشک مصرف نکنید.

موانع مصرف:

- بالا بودن اوره یا نقرس.
- سابقه nephrolithiasis

Reference:
1)USPDI 2007, 27th Edition, Vol 2, Drug information for health care professional,
pages: 1125-1127



ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsoos
Road, Tehran 1398834111 - IRAN www.ramopharmin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا،
خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۲۰ - ۶۰ ۵۳ ۴۴ - ۲۱. نمابر: ۵۰ ۳۵ ۵۰ - ۴۴ - ۲۱