ویتامین ث ۵۰۰ میلی‌گرم
قرص جویدنی

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح فرآورده:
- این فرآورده مکمل است و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری نمی‌باشد.

هنگام مصرف فرآورده به نکات زیر توجه کنید:
- بیش از مقدار تجویز شده مصرف ننمایید.
- در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده‌ها/داروهای دیگر قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

موارد منع مصرف و نکات قابل توصیه:
- در بیماران با کمبود G6PD مصرف دوز بالا سبب همولیز می‌گردد.
- در بیماران با هایپراگزالوریا با احتیاط مصرف گردد.

مورد مصرف:
- کمک به تامین ویتامین ث و کمک به سلامت سیستم ایمنی.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:
- در بارداری و شیردهی مطابق دستور پزشک مصرف گردد.

مقدار و نحوه مصرف فرآورده:
- روزانه ۱ تا ۲ قرص یا طبق دستور پزشک میل نمایید.

تداخلات دارویی:
- آلومینیوم هیدروکساید، آمفتامین‌ها، مس، سیکلوسپورین، دفروکسامین.

عوارض جانبی:
- در دوزهای بالا بعضا باعث اسهال و دیگر اختلالات گوارشی شده است. هم‌چنین در مواردی هایپراگزالوریا و تشکیل سنگ کلیه کلسیم اگزالات مشاهده شده است.
- در صورت استفاده طولانی مدت با دوز بالا از فرآورده ممکن است پدیده تحمل ایجاد گردد که در این صورت هنگام کاهش مقدار مصرف فرآورده به میزان نرمال، علایم کمبود بروز خواهد کرد.
- استفاده طولانی و بیش از حد فرم جویدنی ویتامین ث ممکن است باعث تخریب مینای دندان گردد.
- در بیماران با کمبودG6PD مصرف دوز بالا سبب همولیز می‌گردد.

مسمومیت:
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد توصیه شده بیمار را به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری:
- فرآورده دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری گردد.

بسته بندی:
- قرص ویتامین ث ۵۰۰ میلی گرم (جویدنی) به صورت ۳ بلیستر ۲۰ عددی در جعبه مقوایی به همراه برگه راهنمای فرآورده بسته بندی می‌گردد.

References:
1)Martindale 2009 ,36th Edition, page: 1983-1984
2)uptodate

ساخت شرکت داروسازی رامو فارمین
تهران - ایران

تهران، کیلومتر۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا، خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی، کد پستی: ۱۳۹۸۸۳۴۱۱۱
تلفن: ۲۴ - ۲۰ ۶۰ ۵۳ ۴۴ ۰۲۱ - نمابر: ۵۰ ۳۵ ۵۰ ۴۴ ۰۲۱

Valiasr Ave, Shishe sazi Mina St, km 4 Karaj Makhsuos Road, Tehran 13 98 83 41 11 - IRAN www.ramopharmin.com
Tel: +98 21 44 53 60 20 - 24 Fax: +98 21 44 50 35 50